

# OPPGAVER I TRIGONOMETRI, KOMPLEKSE TALL OG GEOMETRISKE REKKER

- Ukeoppgavene skal leveres som selvstendige arbeider. Det forventes at alle har satt seg inn i instituttets krav til innleverte oppgaver:
  - Norsk versjon: <http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf>
  - Engelsk versjon: <http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/declaration.doc>
- Krav til godkjenning av innleverte oppgaver er beskrevet i filen:
  - <http://www.ifi.uio.no/inf3470/h07/kursmaterieill/Oppgaver/KravTilGodkjenning.pdf>

## Mål

Kurset INF3470 krever en viss grad av kunnskap om matematikk, både i form av kjennskap til teori og erfaring med bruk og praktisk regning. Oppgavene her oppsummerer en del av de viktigste punktene man bør kjenne til for at resten av teorien i kurset skal bli enklere å ta til seg.

## Oppgave 1 Trigonometriske funksjoner

Vekt:2

a) Plott følgende trigonometriske funksjoner under hverandre (med parallelle t-akser) for intervallet  $-1 \leq t \leq 2.5$ , slik at du får vist hvordan de forholder seg til hverandre mht. frekvens og faseskift.

1.  $\cos(2\pi t)$
2.  $\cos(2\pi t + \pi)$
3.  $\cos(8\pi t)$
4.  $\cos(4\pi t - \pi/3)$

b) Finn frekvens, faseskift og amplitude for cosinus-funksjonene i figur 1.

c) Bruk fasoraddisjon for å skrive følgende funksjoner på formen

$$A \cos(\omega t + \phi) \quad (1)$$

1.  $\cos(\omega t) + \cos(\omega t + \phi)$   $\boxed{2 \cos \frac{\phi}{2} \cos(\omega t + \phi/2)}$
2.  $4 \cos(\omega t + \pi/2) + 1.5 \cos(\omega t - \pi/3)$   $\boxed{\hat{A} = 2.8, \hat{\phi} = 1.3}$
3.  $\cos(\omega t + 4\pi/3) + \cos(\omega t - 5\pi/3)$   $\boxed{\hat{A} = 0}$

## Oppgave 2 Diskrete trigonometriske funksjoner

Vekt:2

a) Hvilke av de følgende *diskrete* funksjonene er periodiske, og hva er periodene deres (dvs.  $N$ )?





1.  $\cos(0.5n + \pi/2)$   $\boxed{\text{Ikke periodisk}}$
2.  $\cos(\pi n + \pi/2)$   $\boxed{\text{Periodisk}}$
3.  $\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\pi n\right)$   $\boxed{\text{Ikke periodisk}}$

b) Angi den cosinus-funksjonen i diskret tid som vi får ved å ta 5 sampler per halve periode av en cosinus i kontinuerlig tid.

$$\boxed{\cos(\pi/5 n)}$$

c) Angi den cosinus-funksjonen i diskret tid som vi får ved å ta sampler med avstand 1 sekunder av en cosinus i kontinuerlig tid med vinkelfrekvens 1.  $\boxed{\cos n}$

d) Deloppgaven er fjernet. e) Deloppgaven er fjernet.



Figur 1: Finn frekvens, faseskift og amplitude for cosinus-funksjonene i figur.

### Oppgave 3 Regning med komplekse tall

Vekt:1

a) Gjør følgende utregninger:

1.  $|3 + j4|$  5

2.  $\frac{1}{3+j4}$  til kartesisk form  $\frac{3}{25} - j\frac{4}{25}$

3.  $\frac{1+j2}{1+e^{j\pi/2}}$  til kartesisk form  $\frac{3}{2} + \frac{j}{2}$

4.  $(-1)^n + e^{j\pi n}$ , hvor  $n$  er et heltall  $2 \cdot (-1)^n$

b) Vis at

$$(\cos(\theta) + j \sin(\theta))^n = (\cos(n\theta) + j \sin(n\theta)) \quad \text{Ref. til de Moivres formel} \quad (2)$$

### Oppgave 4 Komplekse tall og det komplekse tallplanet

Vekt:1

Gitt et komplekstall på kartesisk form  $z = a + jb$ . Vi kaller  $a = \Re\{z\}$  for realdelen til  $z$  og  $b = \Im\{z\}$  for imaginærdelen til  $z$ .  $j = \sqrt{-1}$  er den såkalte imaginære enheten. (Merk at den imaginære enheten kalles ofte  $j$  i fysiske fag som dette, og  $i$  i matematiske fag som kompleks analyse.)

a) Et komplekstall på kartesisk form kan representeres i det kartesiske koordinatsystemet som punktet  $(a, b)$ . Et annet koordinatsystem er det polare, der de to koordinatene  $(r, \theta)$  angir hhv. avstand fra origo og vinkel mot førsteaksen. Lag en skisse

og bruk trigonometri for å finne  $(r, \theta)$  fra  $(a, b)$ .  $r = \sqrt{a^2 + b^2}, \theta = \text{atan}\left(\frac{b}{a}\right)$

b) En vanlig operasjon på komplekse tall er å *komplekskonjugere*:  $z^* = (a + jb)^* = a - jb$ . Dette tilsvarer å snu fortegnet på imaginærdelen. Hva slags geometrisk operasjon tilsvarer dette i det kartesiske koordinatsystemet?  $\cos \theta + j \sin -\theta$

c) Gi en tolkning av  $(e^{j\theta})^k$  i koordinatsystemet. Skisser for  $k = 1, 2, 3$  og valgfri  $\theta$ . Hva må  $\theta$  være for at  $(e^{j\theta})^k = 1$ ?  $\cos \theta k + j \sin \theta k$

### Oppgave 5 Regning med komplekse tall

Vekt:2

a) Regn ut følgende for polar ( $z = re^{j\theta}$ ) og/eller kartesisk ( $z = a + jb$ ) form som angitt:

1.  $z^*$  på polar form  $re^{-j\theta}$

2.  $zz^*$  på polar og kartesisk form (hva er dette det samme som?)  $a^2 + b^2 = r^2$

3.  $z^k$  på polar form  $r^k e^{j\theta k}$

4.  $z + z^*$  på polar og kartesisk form  $2r \cos \phi$

5.  $z - z^*$  på polar og kartesisk form  $2jr \sin \phi$

6.  $\frac{1}{2}(z + z^*)$  på polar og kartesisk form  $r \cos \theta$

7.  $\frac{1}{2j}(z - z^*)$  på polar og kartesisk form  $r \sin \theta$

8.  $z^{-1}$  på polar og kartesisk form (**Merk:** oppgaven er å finne  $c$  og  $d$  slik at  $c + jd = \frac{1}{a+jb}$ , samt  $s$  og  $\phi$  slik at  $se^{j\phi} = \frac{1}{re^{j\theta}}$ .)

$\frac{a - jb}{a^2 + b^2}, \frac{1}{r} e^{-j\phi}$

9. Bruk punktene over for å finne et uttrykk for  $\cos(\theta)$  og  $\sin(\theta)$  ved komplekse eksponentialer.

$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

10. Hva er mengden av alle punkter som kan beskrives med det komplekse eksponentialet  $z = e^{j\theta}$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ ?

Enhetssirkelen i det komplekse talplanet

11. Hva er forskjellen på  $z^{-1}$  og  $z^*$ ?

$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{|z|^2}$$

b) Skriv følgende tall som komplekse tall på polar form ( $k$  er et vilkårlig heltall):

1.  $1$   $1e^{j \cdot 2\pi k}$

2.  $-1$   $1e^{j(\pi+n \cdot 2\pi)}$

3.  $(-1)^k$   $1e^{jk\pi}$

4.  $j^k$   $1e^{jk\pi/2}$

## Oppgave 6 Geometriske rekker

Vekt:2

a) Beregn verdien til følgende endelige geometriske rekker:

1.  $\sum_{k=0}^{100} 23^k$   $\frac{1 - 23^{101}}{1 - 23} = 1.56 \cdot 10^{136}$

2.  $\sum_{k=5}^{19} (4.5)^k$   $\frac{4.5^5 - 4.5^{20}}{1 - 4.5} = 3.31 \cdot 10^{12}$

b) Bestem hvilke av de følgende uendelige geometriske rekkene som konvergerer, og beregn verdien til disse:

1.  $\sum_{k=0}^{\infty} 1^k$  Konvergerer ikke

2.  $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{a}\right)^k, a > 4$  Konvergens for  $a > 4$

3.  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{-k}$  Konvergerer ikke

4.  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{-|k|}$  Konvergerer

c) Finn konvergensområdet til følgende uendelige geometriske rekker:

1.  $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^k, x \in \mathbb{R}$   $\left|\frac{x}{2}\right| < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 2$

2.  $\sum_{k=0}^{\infty} (x^{-1})^k, x \in \mathbb{R}$   $\left|\frac{1}{x}\right| < 1 \Leftrightarrow x > 1 \text{ or } x < -1$

3.  $\sum_{k=0}^{\infty} (z^{-1})^k, z \in \mathbb{C}$   $\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} < 1$

4.  $\sum_{k=0}^{\infty} (x^2)^k, x \in \mathbb{R}$   $-1 < x < 1$

5.  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-k}, z \in \mathbb{C}$   $|z| > 2$