

INF3170 – Logikk

Forelesning 9: Mer sekventkalkyle og kompletthet

Roger Antonsen

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

13. april 2010

(Sist oppdatert: 2010-04-13 12:04)



Kompletthet av LK

Kompletthet av LK

Overblikk

Strategier

Herbranduniverset

Rettferdige strategier

Königs lemma

Bevis for modelleksistensteoremet

Eksempler på eksistens av motmodell

Overblikk

- Vi skal nå bevise at LK er komplett.
- Ikke bare er LK sunn, den kan også vise *alle* gyldige sekventer.
- Det er ingen “hull” i mengden av LK-bevisbare formler.
- Det er to måter å forstå “fra φ følger ψ ” på:
 1. Semantisk: $\varphi \models \psi$, hvis φ er sann, så er ψ sann.
 2. Syntaktisk: $\varphi \vdash \psi$, det fins et bevis for sekventen $\varphi \vdash \psi$ / fra antakelsen φ , så kan ψ bevises.
- Med sunnhet og kompletthet, så blir disse ekvivalente.

Kurt Gödel (1906-1978)



Kurt Gödel
(1906-1978)

- En av de mest betydningsfulle logikere noensinne.
- Har hatt enorm innflytelse på logikk, matematikk og filosofi.
- Det er han som først viste kompletthet av førsteordens logikk (1929).
- Er mest kjent for ufullstendighetsteoreme (1931) og at kontinuumshypotesen er konsistent med mengdelæren (1937).

Overblikk

Teorem (Kompletthet)

Hvis $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig, så er den bevisbar i LK.

For å vise *kompletthet*, viser vi den ekvivalente påstanden:

Lemma (Modelleksistens)

Hvis $\Gamma \vdash \Delta$ *ikke* er bevisbar i LK, så er den falsifiserbar.

Dvs. det finnes en modell som gjør alle formler i Γ sanne og alle formler i Δ usanne.

Merk at vi uansett går fra en universell påstand (“for alle modeller”) til en eksistensiell påstand (“det fins et bevis”).

Strategier

- Hvis en formel eller sekvent er gyldig, kan vi ha en **garanti** for at vi finner et bevis ved å begynne med en rotsekvent og anvende LK-reglene gjentatte ganger?
- For å gjøre dette litt mer presist, innfører vi begrepet **strategi**.

Definisjon (Strategi)

En **strategi** for LK er en angivelse av hvordan LK-reglene systematisk skal anvendes på formler i LK-utledninger.

- Med vilje litt vagt. Mye kan være en strategi.
- Vi er interessert i strategier som garanterer at vi får et bevis til slutt hvis det er slik at bevis fins. La oss kalle slike strategier for “gode”.

Strategier

Definisjon (Formeltype)

La φ være en formel i en utledning. Vi sier at φ er av **type** θ hvis φ kan være hovedformelen i en θ -slutning.

Eksempel

$$Pa \wedge Pb, Qa \vee Qb \vdash \exists xPx, \forall xPx$$

- $Pa \wedge Pb$ er en α -formel
- $Qa \vee Qb$ er en β -formel
- $\exists xPx$ er en γ -formel
- $\forall xPx$ er en δ -formel

Strategier

En enkel strategi

1. Anvend α -regler så mange ganger som mulig, dvs. helt til ingen løvsekvent lenger inneholder en formel av type α . Gå til ②.
2. Anvend β -regler så mange ganger som mulig.

$$\frac{\frac{\frac{\times}{P, Q \vdash P} \quad \frac{\times}{P, Q \vdash Q}}{P, Q \vdash P \wedge Q} \textcircled{2}}{P \wedge Q \vdash P \wedge Q} \textcircled{1}$$

- Denne strategien er ikke “god”. Det kan hende at ① må anvendes etter at ② er anvendt.

En “god” strategi for utsagnslogikk.

1. Anvend α -regler så mange ganger som mulig. Gå til ②.
2. Anvend β -regler så mange ganger som mulig. Gå til ③.
3. Hvis det er mulig å anvende en α -regel, gå til ①.

$$\frac{\frac{\frac{\times}{P, Q \vdash P, R, R} \quad \frac{\times}{P, Q \vdash Q, R, R}}{P, Q \vdash P \wedge Q, R, R} \textcircled{2}}{\neg(P \wedge Q), P, Q \vdash R, R} \textcircled{1}}{\frac{\times}{R, P, Q \vdash R, R} \textcircled{2}}{\frac{\neg(P \wedge Q) \vee R, P, Q \vdash R, R} \textcircled{1}}{\frac{\neg(P \wedge Q) \vee R, P \vdash R, Q \rightarrow R} \textcircled{1}}{\frac{\neg(P \wedge Q) \vee R \vdash P \rightarrow R, Q \rightarrow R} \textcircled{1}}{\neg(P \wedge Q) \vee R \vdash (P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)} \textcircled{1}}$$

Strategier

- Hva skal til for at en strategi skal være “god”?
1. Alle formler må analyseres før eller senere.

$$\frac{\frac{\frac{Pffa, Pfa, Pa, \forall xPx, Qfa \wedge Qfa \vdash Qfa}{Pfa, Pa, \forall xPx, Qfa \wedge Qfa \vdash Qfa}}{Pa, \forall xPx, Qfa \wedge Qfa \vdash Qfa}}{\forall xPx, Qfa \wedge Qfa \vdash Qfa}$$

2. Vi må forsøke å sette inn “alle termer” for γ -formler.

$$\frac{\frac{\frac{Pggga, Pga, Pa, \forall xPx \vdash Qga, Pfffb}{Pga, Pa, \forall xPx \vdash Qga, Pfffb}}{Pa, \forall xPx \vdash Qga, Pfffb}}{\forall xPx \vdash Qga, Pfffb}$$

- Vi må kunne snakke om “alle termer” på en presis måte. . .

Herbranduniverset

Definisjon (Herbranduniverset)

La T være en mengde termer. Da er $\mathcal{H}(T)$, **Herbranduniverset til T** , den minste mengden slik at:

- $\mathcal{H}(T)$ inneholder alle konstanter fra T . Hvis det ikke er noen konstanter i T , så er en parameter o fra par (kalt en dummykonstant) med i $\mathcal{H}(T)$.
- Hvis f er et funksjonssymbol i T med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer i $\mathcal{H}(T)$, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ i $\mathcal{H}(T)$.

Herbranduniverset til en mengde formler er Herbranduniverset til mengden av termer som forekommer i formlene. Herbranduniverset til en gren er Herbranduniverset til mengden av formler som forekommer i grenen.

- Intuitivt, så er Herbranduniverset til T mengden av alle *lukkede* termer som kan genereres fra termer i T .

Herbranduniverset

Eksempel

La $T = \{f(x)\}$. Da er Herbranduniverset til T mengden

$\{o, fo, ffo, fffo, \dots\}$

Eksempel

La $T = \{a, f(x)\}$. Da er Herbranduniverset til T mengden

$\{a, fa, ffa, fffa, \dots\}$

Eksempel

La $F = \{\forall x H(f(g(x)))\}$. Da er Herbranduniverset til F mengden

INF3170 – Logikk $\{o, fo, go, fgo, gfo, ffo, ggo, \dots\}$

13

Rettfærdige strategier

- Enhver rettfærdig strategi må gjre at
 - alle formler blir analysert fr eller senere, og
 - alle γ -formler blir instansiert med alle termer fr eller senere.
- Hvis vi flger en rettfærdig strategi, s skal én av to ting skjje:
 1. Enten s klarer vi å lukke alle grener og fr et bevis,
 2. eller s fins en åpen gren som vi kan lage en motmodell fra.
- For at dette skal gi mening må vi godta at utledninger kan vre uendelig store, dvs. ha uendelig lange grener.
- Vi kan tenke at vi gr til *grensen* i konstruksjonen av en utledning, enten ved at ingen regler lenger kan anvendes eller ved å fortsette med regelanvendelser i det uendelige. Vi kaller slike for **grenseutledninger**.
- Vi inkluderer alts uendelige trr nr vi snakker om grenseutledninger.
- Merk: hvis alle grener i en utledning kan lukkes, s er utledningen endelig.

INF3170 – Logikk

13. april 2010

14

Rettfærdige strategier

- Vi skal n abstrahere over alle “gode” strategier.

Definisjon (Rettfærdig strategi)

En strategi er **rettfærdig** hvis enhver grenseutledning som fs ved å flge strategien har flgende egenskaper:

1. Hvis φ er en α -, β - eller δ -formel i en gren som ikke er lukket, s er φ hovedformel i en slutning i grenen.
2. Hvis φ er en γ -formel p formen $Qx\psi$ i en gren som ikke er lukket, s er $\psi[t/x]$ aktiv formel i en slutning i grenen, for alle termer t i Herbranduniverset til grenen.

INF3170 – Logikk

13. april 2010

15

Knigs lemma

Lemma (Knigs lemma)

Hvis T er et uendelig tre, men hvor enhver forgrening er endelig, s fins det en uendelig lang gren.

Bevis

Vi definerer en uendelig lang gren induktivt. La u_0 vre rotnoden i treet T . Siden T er uendelig og u_0 har endelig mange etterkommere, s m ett av de umiddelbare deltrerne fra u_0 vre uendelig. (Ellers ville T ha vrt et endelig tre.) La u_1 vre rotnoden i et slikt deltre. Hvis grenen u_0, u_1, \dots, u_n er generert, s finner man neste node u_{n+1} ved samme type resonnering. Denne prosessen gir en uendelig gren.

INF3170 – Logikk

13. april 2010

16

Bevis for modelleksistensteoremet

- Anta at $\Gamma \vdash \Delta$ ikke er bevisbar.
- La π være en utledning (muligens uendelig) av $\Gamma \vdash \Delta$ som fremkommer ved å følge en rettferdig strategi. "En maksimal utledning".
- Siden $\Gamma \vdash \Delta$ ikke er bevisbar, så må det finnes minst en gren som ikke er lukket. (Her bruker vi Königs lemma.) La G være en slik gren. La
 - G^\top være mengden av alle formler som forekommer i en antecedent i G ,
 - G^\perp være mengden av alle formler som forekommer i en succedent i G , og
 - A være mengden av alle atomære formler som forekommer i G^\top .

Bevis for modelleksistensteoremet

- Vi konstruerer nå en motmodell \mathcal{M} for $\Gamma \vdash \Delta$.
- La domenet til \mathcal{M} være Herbranduniverset til grenen (dvs. mengden av alle lukkede termer som kan genereres fra termer som forekommer i grenen).
- La $a^\mathcal{M} = a$ for alle konstantsymboler a .
- Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n , la $f^\mathcal{M}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$.
 - Da vil $t^\mathcal{M} = t$ for alle lukkede termer t .
 - Alle termer tolkes som seg selv.
- Hvis R er et relasjonssymbol med aritet n , la $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^\mathcal{M}$ hvis og bare hvis $R(t_1, \dots, t_n) \in A$.
- En slik modell kalles ofte for en **Herbrandmodell** eller en **termmodell**.

Bevis for modelleksistensteoremet

- Vi viser ved induksjon på førsteordens formler (i språket \mathcal{L}^{par}) at modellen \mathcal{M} gjør *alle* formler i G^\top sanne og alle formler i G^\perp usanne.
- Påstandene som vi viser for førsteordens formler er:
 - Hvis $\varphi \in G^\top$, så $\mathcal{M} \models \varphi$.
 - Hvis $\varphi \in G^\perp$, så $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

Basissteg 1: φ er en atomær formel $R(t_1, \dots, t_n)$ i G^\top .

- Da må $R(t_1, \dots, t_n) \in A$ og $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^\mathcal{M}$ ved konstruksjon.
- Da må $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$.

Basissteg 2: φ er en atomær formel $R(t_1, \dots, t_n)$ i G^\perp .

- Siden G ikke er lukket, må $R(t_1, \dots, t_n) \notin A$ og $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \notin R^\mathcal{M}$.
- Da vil $\mathcal{M} \not\models R(t_1, \dots, t_n)$.

Bevis for modelleksistensteoremet

Induksjonssteg: Fra antakelsen om at påstandene holder for mindre formler, så må vi vise at de holder for $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $\forall x\varphi$ og $\exists x\varphi$.

I beviset for kompletthet av utsagnslogisk LK gjorde vi mesteparten. F.eks. anta at $\varphi \wedge \psi \in G^\top$.

- Ved antakelsen om at strategien var rettferdig, så har $\varphi \wedge \psi$ vært hovedformel i en slutning i grenen G .
- Da vil $\varphi \in G^\top$ **og** $\psi \in G^\top$.
- Ved induksjonshypotesen vil $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.
- Ved definisjonen av oppfylbarhet har vi $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

Formler med kvantorer gjenstår.

Bevis for modelleksistensteoremet

Anta at $\exists x\varphi \in G^{\top}$.

- Ved antakelsen om at strategien var rettferdig, så har $\exists x\varphi$ vært hovedformel i en slutning i grenen.
- Da fins en parameter a slik at $\varphi[a/x] \in G^{\top}$.
- Ved induksjonshypotesen vil $\mathcal{M} \models \varphi[a/x]$.
- Siden $a^{\mathcal{M}} = a$, så vil også $\mathcal{M} \models \varphi[\bar{a}/x]$.
- Ved definisjonen av oppfyllbarhet vil $\mathcal{M} \models \exists x\varphi$.

Bevis for modelleksistensteoremet

Anta at $\exists x\varphi \in G^{\perp}$.

- Ved antakelsen om at strategien var rettferdig, så har $\varphi[t/x]$ vært aktiv formel for alle termer t i Herbranduniverset til grenen.
- Vi har dermed for alle termer t i Herbranduniverset til grenen følgende
 - $\varphi[t/x] \in G^{\perp}$
 - $\mathcal{M} \not\models \varphi[t/x]$ (fra induksjonshypotesen)
 - $\mathcal{M} \not\models \varphi[\bar{t}/x]$ (siden $t^{\mathcal{M}} = t$)
- Husk at domenet til \mathcal{M} er Herbranduniverset til grenen.
- Ved definisjonen av oppfyllbarhet vil $\mathcal{M} \not\models \exists x\varphi$.

Bevis for modelleksistensteoremet

Anta at $\forall x\varphi \in G^{\perp}$.

- Ved antakelsen om at strategien var rettferdig, så har $\forall x\varphi$ vært hovedformel i en slutning i grenen.
- Da fins en parameter a slik at $\varphi[a/x] \in G^{\perp}$.
- Ved induksjonshypotesen vil $\mathcal{M} \not\models \varphi[a/x]$.
- Siden $a^{\mathcal{M}} = a$, så vil også $\mathcal{M} \not\models \varphi[\bar{a}/x]$.
- Ved definisjonen av oppfyllbarhet vil $\mathcal{M} \not\models \forall x\varphi$.

Bevis for modelleksistensteoremet

Anta at $\forall x\varphi \in G^{\top}$.

- Ved antakelsen om at strategien var rettferdig, så har $\varphi[t/x]$ vært aktiv formel for alle termer t i Herbranduniverset til grenen.
- Vi har dermed for alle termer t i Herbranduniverset til grenen følgende
 - $\varphi[t/x] \in G^{\top}$
 - $\mathcal{M} \models \varphi[t/x]$ (fra induksjonshypotesen)
 - $\mathcal{M} \models \varphi[\bar{t}/x]$ (siden $t^{\mathcal{M}} = t$)
- Husk at domenet til \mathcal{M} er Herbranduniverset til grenen.
- Ved definisjonen av oppfyllbarhet vil $\mathcal{M} \models \forall x\varphi$.

Noen kommentarer

- Vi kan se på konstruksjonen av en utledning som en tilnærming/approsimasjon til en motmodell for $\Gamma \vdash \Delta$.
- Jo flere ganger vi anvender regler (ved å følge en rettferdig strategi), jo nærmere kommer vi en eventuell motmodell.
- For å lage en motmodell på denne måten, kan det være nødvendig å anvende reglene uendelig mange ganger.
- Ofte fins det endelige motmodeller der hvor denne metoden gir en uendelig motmodell. Å finne endelige motmodeller der hvor det fins er ikke lett. Dette er noe det forskes på.
- Idéen i kompletthetsbeviset er viktig. Konstruksjonen av modeller fra noe rent syntaktisk. Et filosofisk spørsmål: Er det egentlig et skille mellom syntaks og semantikk?

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \text{G} \qquad \qquad \qquad \times \\
 \frac{Qa, \varphi, Pa \vdash Qb, Pb \quad Qb, Qa, \varphi, Pa \vdash Qb}{Qa, \varphi, Pb \rightarrow Qb, Pa \vdash Qb} \\
 \times \\
 \frac{\varphi, Pa \vdash \forall x Qx, Pa \quad \frac{Qa, \varphi, Pa \vdash Qb}{Qa, \varphi, Pa \vdash \forall x Qx}}{\varphi, Pa \rightarrow Qa, Pa \vdash \forall x Qx} \\
 \underbrace{\forall x (Px \rightarrow Qx)}_{\varphi}, Pa \vdash \forall x Qx
 \end{array}
 \end{array}$$

- Herbranduniverset til grenen G, og domenet til \mathcal{M} , er $\{a, b\}$.
- Siden $Pa \in G^{\top}$ vil $a \in P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \models Pa$.
- Siden $Qa \in G^{\top}$ vil $a \in Q^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \models Qa$ og $\mathcal{M} \models Pa \rightarrow Qa$.
- Siden $Qb \in G^{\perp}$ vil $b \notin Q^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \not\models Qb$ og $\mathcal{M} \not\models \forall x Qx$.
- Siden $Pb \in G^{\perp}$ vil $b \notin P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \not\models Pb$ og $\mathcal{M} \models Pb \rightarrow Qb$.
- Dermed har vi også $\mathcal{M} \models \forall x (Px \rightarrow Qx)$.
- \mathcal{M} oppfyller alle formlene i G^{\top} og falsifiserer alle formlene i G^{\perp} .

(Greit. Begge grener lukkes.)

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \times \qquad \qquad \qquad \text{G} \\
 \frac{\varphi, Pba \vdash Pab, Paa, Pba \quad Pbb, \varphi, Pba \vdash Pab, Paa}{\varphi, Pba \rightarrow Pbb, Pba \vdash Pab, Paa} \\
 \times \\
 \frac{\varphi, Pba \vdash Pab, Paa \quad Pab, \varphi, Pba \vdash Pab}{\varphi, Paa \rightarrow Pab, Pba \vdash Pab} \\
 \frac{\varphi, Paa \rightarrow Pab, Paa \vdash Pab}{\varphi, Paa \vdash Pab} \\
 \underbrace{\forall x (Pxa \rightarrow Pxb)}_{\varphi}, Paa \vee Pba \vdash Pab
 \end{array}
 \end{array}$$

- Herbranduniverset til grenen G - og domenet til \mathcal{M} - er $\{a, b\}$.
- Siden $Pab \in G^{\perp}$ vil $\langle a, b \rangle \notin P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \not\models Pab$.
- Siden $Pba \in G^{\top}$ vil $\langle b, a \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \models Pba$ og $\mathcal{M} \models Paa \vee Pba$.
- Siden $Paa \in G^{\perp}$ vil $\langle a, a \rangle \notin P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \not\models Paa$ og $\mathcal{M} \models Paa \rightarrow Pab$.
- Siden $Pbb \in G^{\top}$ vil $\langle b, b \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ og $\mathcal{M} \models Pbb$ og $\mathcal{M} \models Pba \rightarrow Pbb$.
- Dermed har vi også $\mathcal{M} \models \forall x (Pxa \rightarrow Pxb)$.
- \mathcal{M} oppfyller alle formlene i G^{\top} og falsifiserer alle formlene i G^{\perp} .