

# INF1800 – Forelesning 18

## Førsteordens logikk

Roger Antonsen - 15. oktober 2008

(Sist oppdatert: 2008-10-15 23:50)

### Repetisjon og noen løse tråder

#### Førsteordens språk

Et førsteordens språk  $\mathcal{L}$  består av:

1. Logiske symboler

- konnektiver:  $\wedge, \vee, \rightarrow$  og  $\neg$
- hjelpesymboler: ‘(’ og ‘)’ og ‘;’
- kvantorer:  $\exists$  og  $\forall$
- variable:  $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

2. Ikke-logiske symboler:

- en tellbar mengde konstantsymboler
- en tellbar mengde funksjonssymboler (med aritet)
- en tellbar mengde relasjonssymboler (med aritet)
- De ikke-logiske symbolene utgjør en *signatur*

$$\langle \underbrace{c_1, c_2, c_3, \dots}_{\text{konstantsymboler}} ; \underbrace{f_1, f_2, f_3, \dots}_{\text{funksjonssymboler}} ; \underbrace{R_1, R_2, R_3, \dots}_{\text{relasjonssymboler}} \rangle.$$

#### Eksempler på signaturer

Vi har sett følgende signaturer:

enkelt språk:	$\langle$	$a$	$;$	$f, g$	$;$	$P, R$	$\rangle$
aritmetikk 1:	$\langle$	$0$	$;$	$s, +$	$;$	$=$	$\rangle$
aritmetikk 2:	$\langle$	$0, 1$	$;$	$+, \times$	$;$	$=, <$	$\rangle$
mengdelære:	$\langle$	$\emptyset$	$;$	$\cap, \cup$	$;$	$=, \in$	$\rangle$
familierelasjoner:	$\langle$	Ola, Kari	$;$	mor, far	$;$	Mor, Far, Slektning	$\rangle$
beundring:	$\langle$	$a, b$	$;$		$;$	Idol, Liker	$\rangle$

#### Mengden av førsteordens termer og formler

Hvis et førsteordens språk  $\mathcal{L}$  er gitt, så får vi (definert induktivt):

1. Mengden  $\mathcal{T}$  av termer i  $\mathcal{L}$ :

- Enhver variabel og konstant er en term.
- Hvis  $f$  er et funksjonssymbol med aritet  $n$  og  $t_1, \dots, t_n$  er termer, så er  $f(t_1, \dots, t_n)$  en term.

## 2. Mengden $\mathcal{F}$ av formler i $\mathcal{L}$ :

- Hvis  $R$  er et relasjonssymbol med aritet  $n$  og  $t_1, \dots, t_n$  er termer, så er  $R(t_1, \dots, t_n)$  en (atomær) formel.
- Hvis  $\varphi$  og  $\psi$  er formler, så er  $\neg\varphi$ ,  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$  og  $(\varphi \rightarrow \psi)$  formler.
- Hvis  $\varphi$  er en formel og  $x$  er en variabel, så er  $\forall x\varphi$  og  $\exists x\varphi$  formler.
- En variabel  $x$  er bundet hvis den er innenfor skopet til en kvantor.
- En variabelforekomst er fri hvis den ikke er bundet.
- En term som ikke inneholder variable kalles lukket.

## En kort oppsummering av modeller

En modell  $\mathcal{M}$  for et språk  $\mathcal{L}$  består av

1. en ikke-tom mengde  $|\mathcal{M}|$ , kalt domenet til  $\mathcal{M}$ , og
2. en tolkning av alle ikke-logiske symboler i språket.

For eksempel, hvis  $\mathcal{L}$  er språket  $\langle \text{♣}, \text{♠}, \text{♣♠}; \text{♣♠}; \text{♀}, \text{♂} \rangle$ , så må en modell  $\mathcal{M}$  gi et domene og en tolkning til alle symbolene.

- $\text{♣}^{\mathcal{M}}$ ,  $\text{♠}^{\mathcal{M}}$  og  $\text{♣♠}^{\mathcal{M}}$  må være elementer i domenet.
- $\text{♣♠}^{\mathcal{M}}$  må være en funksjon på domenet.
- $\text{♀}^{\mathcal{M}}$  og  $\text{♂}^{\mathcal{M}}$  må være relasjoner på domenet.
- Husk på ariteten til symbolene.
- Her kan for eksempel  $\text{♣♠}$  ha aritet 2, og  $\text{♀}$  og  $\text{♂}$  ha aritet 1.
- En mulig formel i dette språket er  $\text{♂}(\text{♣}) \wedge \forall x(\text{♀}(x) \rightarrow \text{♂}(\text{♣♠}(\text{♣}, \text{♣♠})))$ .

## Substitusjoner og frie variable

- Vi har sett at substitusjon ikke blir gjort for bundne variable.
- Vi har enda et tilfelle hvor vi ønsker å forhindre substitusjon.

### Eksempel.

- $\exists xP(x, y)[y/f(x)] = \exists xP(x, f(x))$

- Her blir en variabel bundet *etter* substitusjon.
- Dette kan endre meningen til en formel på en måte som vi ikke ønsker.

### Definisjon.

Vi sier at  $t$  er fri for  $x$  i  $\varphi$  hvis ingen variabel i  $t$  blir bundet som følge av å substituere  $t$  for  $x$  i  $\varphi$ .

### Eksempel.

Termen  $f(x)$  er ikke fri for  $y$  i formelen  $\exists xP(x, y)$ .

- En måte å unngå dette på er å omdøpe bundne variable først.
- F.eks. se på  $\exists zP(z, y)$  i stedet for  $\exists xP(x, y)$ .
- Fra nå av antar vi at alle substitusjoner er “fri for”, det vil si at ingen variable blir bundet som følge av en substitusjon.

## Lukkede og åpne formler

### Definisjon (Lukket/åpen formel).

En formel  $\varphi$  er *lukket* hvis  $FV(\varphi) = \emptyset$ , det vil si at  $\varphi$  ikke inneholder noen frie variable. En formel er *åpen* hvis den ikke inneholder noen kvantorer.

### Eksempel.

- $\forall xPxa$  er lukket.
- $\forall xPxy$  er *ikke* lukket.
- $Pxy$  er *ikke* lukket, men åpen.
- $Pab$  er åpen og lukket.

## Presedensregler

- På samme måte som for utsagnslogiske formler, har vi presedensregler for førsteordens formler.
- Mengden  $\mathcal{F}$  av førsteordens formler er helt presist definert, men vi skal også godta f.eks.  $\exists yPy \wedge Px$  som førsteordens formler (selv om parentesene mangler).
- Vi gir konnektivene ulik *presedens* i forhold til hverandre.
  1.  $\neg, \forall$  og  $\exists$  binder sterkest.
  2.  $\wedge$  binder svakere.
  3.  $\vee$  binder enda svakere.
  4.  $\rightarrow$  binder svakest.
- For eksempel:
  - $\exists yPy \wedge Px$  betyr  $(\exists yPy) \wedge Px$  og *ikke*  $\exists y(Py \wedge Px)$

## Semantikk (fortsettelse)

### Noen kommentarer

1. Et funksjonssymbol  $f$  med aritet 0 kan betraktes som en konstant.
  - Da er  $f^{\mathcal{M}}$  en funksjon fra  $D^0$  til  $D$ .
  - Siden  $D^0$  består av kun ett element  $\langle \rangle$  – det tomme tuppelet – så består  $f^{\mathcal{M}}$  også av kun ett element  $\langle \langle \rangle, e \rangle$ , hvor  $e \in D$ .
  - Vi kan derfor identifisere  $f^{\mathcal{M}}$  med  $e$ .
2. Et relasjonssymbol  $R$  med aritet 0 kan betraktes som en utsagnsvariabel.
  - Da er  $R^{\mathcal{M}}$  en delmengde av  $D^0$ .
  - Siden  $D^0$  består av kun ett element  $\langle \rangle$  – det tomme tuppelet – så fins det nøyaktig to muligheter for  $R^{\mathcal{M}}$ .
  - Enten så er  $R^{\mathcal{M}}$  tom eller så er  $\langle \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ .
  - Vi kan derfor tenke på mengden  $\{\emptyset, \{\langle \rangle\}\}$  av delmengder av  $D^0$  som **Bool**.
3. Et tuppel  $\langle e \rangle$ , hvor  $e \in D$ , kan vi identifisere med elementet  $e$ .
  - Når et relasjonssymbol  $R$  har aritet 1, så skriver vi derfor  $\{e_1, \dots, e_n\}$  i stedet for  $\{\langle e_1 \rangle, \dots, \langle e_n \rangle\}$ .
  - Vi antar derfor også at  $R^{\mathcal{M}} \subseteq D$ .

### Eksempel – Et figurspråk

#### Relasjonssymboler

	aritet
Sirkel	1
Firkant	1
Trekant	1
Stor	1
Liten	1
Mindre	2

- Konstantsymboler:  $a, b, c, d, e, f$ .
- Funksjonssymboler: ingen.
- Vi leser på denne måten:

Sirkel( $x$ )	$x$ er en sirkel
Firkant( $x$ )	$x$ er en firkant
Trekant( $x$ )	$x$ er en trekant
Stor( $x$ )	$x$ er stor
Liten( $x$ )	$x$ er liten
Mindre( $x, y$ )	$x$ er mindre enn $y$


La oss nå lage en modell for dette språket!

## En tolkning av figurspråket

La  $\mathcal{M}$  være en modell med domene  $D = \{\langle \text{red circle}, \text{red circle} \rangle, \langle \text{blue square}, \text{blue square} \rangle, \langle \text{green triangle}, \text{green triangle} \rangle\}$ .

$$\begin{aligned}
 a^{\mathcal{M}} &= \text{red circle} & \text{Sirkel}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \text{red circle}, \text{red circle} \rangle\} \\
 b^{\mathcal{M}} &= \text{red circle} & \text{Firkant}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \text{blue square}, \text{blue square} \rangle\} \\
 c^{\mathcal{M}} &= \text{blue square} & \text{Trekant}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \text{green triangle}, \text{green triangle} \rangle\} \\
 d^{\mathcal{M}} &= \text{blue square} & \text{Stor}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \text{red circle}, \text{blue square} \rangle, \langle \text{blue square}, \text{red circle} \rangle\} \\
 e^{\mathcal{M}} &= \text{green triangle} & \text{Liten}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \text{red circle}, \text{blue square} \rangle, \langle \text{blue square}, \text{red circle} \rangle\} \\
 f^{\mathcal{M}} &= \text{green triangle} & \text{Mindre}^{\mathcal{M}} &= \{\langle \langle \text{red circle}, \text{red circle} \rangle, \langle \text{red circle}, \text{blue square} \rangle \rangle, \langle \langle \text{red circle}, \text{blue square} \rangle, \langle \text{red circle}, \text{green triangle} \rangle \rangle, \langle \langle \text{blue square}, \text{red circle} \rangle, \langle \text{blue square}, \text{red circle} \rangle \rangle, \dots\}
 \end{aligned}$$

Vi foregriper begivenhetene og ser på hvilke atomære formler som er sanne og usanne i modellen  $\mathcal{M}$ .



### Sant

- Sirkel(a)
- Firkant(c)
- Liten(b)
- Mindre(b, e)

### Usant

- Trekant(a)
- Stor(b)
- Mindre(a, b)
- Mindre(a, a)

## Utvidete språk

- I det foregående eksempelet hadde vi konstantsymboler for alle elementer i domenet.
- Det er veldig nyttig.
- Strengt tatt har vi ingen garanti for et språk er så rikt.
- For enkelhets skyld – og for å definere semantikken – så skal vi anta vi at for enhver modell og ethvert språk, så inneholder språket konstantsymboler for alle elementer i domenet til modellen.

### Antakelse.

Hvis  $\mathcal{M}$  er en modell for  $\mathcal{L}$ , så antar vi at for ethvert element  $a$  i  $|\mathcal{M}|$ , så fins et konstantsymbol  $\bar{a}$  i  $\mathcal{L}$ . Vi antar også at  $\mathcal{M}$  tolker  $\bar{a}$  som  $a$ , med andre ord, at  $\bar{a}^{\mathcal{M}} = a$ .

## Utvidete språk (i detalj – for spesielt interesserte)

- ★ Det går an å gjøre dette mer detaljert og nøyaktig, uten antakelsen om at alle språk har konstantsymboler for alle elementer.
- ★ Idéen er da å lage et nytt språk for hver modell og hvert språk.
- ★ Her er detaljene for de som er spesielt interessert.

### Definisjon (Utvidet språk $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ ).

La  $\mathcal{L}$  være et førsteordens språk og  $\mathcal{M}$  en modell for  $\mathcal{L}$ . Da er  $\mathcal{L}(\mathcal{M})$  det førsteordens språket man får fra  $\mathcal{L}$  ved å legge til nye konstantsymboler for hvert element i  $|\mathcal{M}|$ . Hvis  $a$  er i  $|\mathcal{M}|$ , så skriver vi  $\bar{a}$  for den nye konstanten. Hvis  $\mathcal{N}$  er en modell for  $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ , så krever vi at  $\bar{a}^{\mathcal{N}} = a$ .

- ★ Når vi tolker termer og formler fra språket  $\mathcal{L}$  i en modell  $\mathcal{M}$ , så bruker vi det utvidete språket  $\mathcal{L}(\mathcal{M})$  og antar at  $\mathcal{M}$  er en  $\mathcal{L}(\mathcal{M})$ -modell.

## Tolkning av termer

### Definisjon (Tolkning av lukkede termer).

La  $\mathcal{L}$  være et førsteordens språk, og la  $\mathcal{M}$  være en modell for  $\mathcal{L}$ . Da tolker vi en lukket term  $f(t_1, \dots, t_n)$  på følgende måte:

$$f(t_1, \dots, t_n)^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}}).$$

- Dette er et eksempel på en *rekursiv* definisjon.
  - Tolkningen av konstantsymboler er allerede gitt, siden  $\mathcal{M}$  er en modell for  $\mathcal{L}$ . Dette gir basistilfellet for rekursjonen.
  - Vi utvider tolkninger til å gjelde for sammensatte termer.
- Vi merker oss at tolkninger kun er definert for *lukkede* termer.
- Når vi nå har angitt hvordan lukkede termer skal tolkes, kan vi gå over til å definere hvordan *formler* skal tolkes.

## Tolkning av formler

### Definisjon (Tolkning av lukkede formler).

La  $\mathcal{L}$  være et førsteordens språk, og la  $\mathcal{M}$  en modell for  $\mathcal{L}$ . Vi definerer (ved rekursjon) hva det vil si at en lukket formel  $\varphi$  er *sann* i  $\mathcal{M}$ . Vi skriver  $\mathcal{M} \models \varphi$  for at  $\varphi$  er sann i  $\mathcal{M}$  eller at  $\mathcal{M}$  gjør  $\varphi$  sann.

- For atomære formler:  $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$  hvis  $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ .
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$  hvis det *ikke* er tilfelle at  $\mathcal{M} \models \varphi$ .
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$  hvis  $\mathcal{M} \models \varphi$  og  $\mathcal{M} \models \psi$ .
- $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$  hvis  $\mathcal{M} \models \varphi$  eller  $\mathcal{M} \models \psi$ .
- $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$  hvis  $\mathcal{M} \models \varphi$  *impliserer*  $\mathcal{M} \models \psi$ .
- $\mathcal{M} \models \forall x\varphi$  hvis  $\mathcal{M} \models \varphi[x/\bar{a}]$  for alle  $a$  i  $|\mathcal{M}|$ .
- $\mathcal{M} \models \exists x\varphi$  hvis  $\mathcal{M} \models \varphi[x/\bar{a}]$  for *minst en*  $a$  i  $|\mathcal{M}|$ .

## Oppfylbarhet

### Definisjon (Oppfylbarhet).

En lukket formel  $\varphi$  er *oppfylbar* hvis det fins en modell  $\mathcal{M}$  som gjør  $\varphi$  sann. Vi sier i så fall at  $\mathcal{M}$  oppfyller  $\varphi$  og at  $\mathcal{M}$  en en modell for  $\varphi$ . Hvis  $\varphi$  ikke er oppfylbar, så er den *kontradiktorisk*.

### Oppfylbar

- $\exists x \text{Liten}(x)$
- $\exists x(\text{Liten}(x) \wedge \text{Stor}(x))$
- $\exists x Px \rightarrow \forall x Px$

### Ikke oppfylbar

- $Pa \wedge \neg Pa$
- $\exists x(\text{Liten}(x) \wedge \neg \text{Liten}(x))$
- $\neg \text{Stor}(a) \wedge \forall x \text{Stor}(x)$

## Gyldighet

### Definisjon (Gyldighet).

En lukket formel  $\varphi$  er *gyldig* hvis den er sann i alle modeller  $\mathcal{M}$ , ellers så er den *falsifiserbar*.

### Gyldig

- $\forall x Px a \rightarrow \forall z Pz a$
- $(\forall x Px \wedge \forall y Qy) \rightarrow \forall x Px$
- $\exists x \text{Liten}(x) \vee \exists x \neg \text{Liten}(x)$

### Ikke gyldig (falsifiserbar)

- $\forall x Px$
- $\exists x \text{Stor}(x) \rightarrow \forall x \text{Stor}(x)$
- $\exists x Px \rightarrow \exists x (Px \wedge Qx)$

## Noen eksempler

### Oppgave.

Lag en modell som oppfyller følgende formler.

1.  $\exists x P x$
2.  $\forall x \neg Q x$

Følgende er én måte å løse denne oppgaven på.

- La domenet til modellen  $\mathcal{M}$  være  $\{1\}$ , det vil si,  $|\mathcal{M}| = \{1\}$ .
- Det er ingen konstantsymboler eller funksjonssymboler i språket, så vi trenger ikke å spesifisere tolkningen av disse.
- La relasjonssymbolene tolkes slik at  $P^{\mathcal{M}} = \{1\}$  og  $Q^{\mathcal{M}} = \emptyset$ .
- Formel 1 er sann fordi  $P(\bar{1})$  er sann, og  $P(\bar{1})$  er sann fordi  $1 \in P^{\mathcal{M}}$ .
- Formel 2 er sann fordi  $\neg Q(\bar{1})$  er sann, og  $\neg Q(\bar{1})$  er sann fordi  $Q(\bar{1})$  er usann, og  $Q(\bar{1})$  er usann fordi  $1 \notin Q^{\mathcal{M}}$ .

### Oppgave.

Lag en modell som oppfyller følgende formler.

1.  $P a \wedge P b$
2.  $\neg \exists x (P x \wedge Q x)$
3.  $\exists x Q x$ .

Følgende er én måte å løse denne oppgaven på.

- La domenet til modellen være  $\{1, 2, 3\}$ , det vil si,  $|\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$ .
- La konstantsymbolene tolkes slik at  $a^{\mathcal{M}} = 1$ ,  $b^{\mathcal{M}} = 2$  og  $c^{\mathcal{M}} = 3$ .
- Det er ingen funksjonssymboler i språket.
- La relasjonssymbolene tolkes slik at  $P^{\mathcal{M}} = \{1, 2\}$  og  $Q^{\mathcal{M}} = \{3\}$ .
- Formel 1 er sann fordi  $1 \in P^{\mathcal{M}}$  og  $2 \in P^{\mathcal{M}}$ .
- Formel 2 er sann fordi  $(P^{\mathcal{M}} \cap Q^{\mathcal{M}}) = \emptyset$ .
- Formel 3 er sann fordi  $3 \in Q^{\mathcal{M}}$ .