

# UNIVERSITETET I OSLO

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Deleksamen i: MAT-INF 1100 — Modellering og beregninger.

Eksamensdag: Onsdag 10. oktober 2012.

Tid for eksamen: 15:00–17:00.

Oppgavesettet er på 6 sider.

Vedlegg: Formelark, svarark.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Svarene føres på eget svarark.

De 10 første oppgavene teller 2 poeng hver, de siste 10 teller 3 poeng hver. Den totale poengsummen er altså 50. Det er 5 svaralternativer for hvert spørsmål, men det er bare ett av disse som er riktig. Dersom du svarer feil eller lar være å krysse av på et spørsmål, får du null poeng. Du blir altså ikke "straffet" med minuspoeng for å svare feil. *Lykke til!*

**NB. Husk å sjekke at du har ført inn svarene riktig på svararket!**

### Oppgaveark

**Oppgave 1.** Det desimale tallet 153 representeres i totalssystemet som

A:  $10001001_2$

B:  $10111011_2$

C:  $11010111_2$

D:  $10011001_2$

E:  $1100001101_2$

**Oppgave 2.** Skrevet i totalssystemet blir det heksadesimale tallet  $e.0c_{16}$

A:  $1110.000011_2$

B:  $1110.00001101_2$

C:  $1100.0000011_2$

D:  $1101.0010110_2$

E:  $1101.00001011_2$

**Oppgave 3.** Desimaltallet 0.125 kan skrives i 2-tallsystemet som

**A:**  $0.101_2$

**B:**  $0.011_2$

**C:**  $0.111_2$

**D:**  $0.0101 \dots_2$  der sifrene 101 gjentas uendelig mange ganger

**E:**  $0.001_2$

**Oppgave 4.** For hvilket grunntall  $\beta$  vil det rasjonale tallet  $1/18$  kunne representeres med en endelig sifferutvikling?

**A:**  $\beta = 2$

**B:**  $\beta = 8$

**C:**  $\beta = 12$

**D:**  $\beta = 10$

**E:**  $\beta = 7$

**Oppgave 5.** Kun ett av følgende utsagn er sant, hvilket?

**A:** Avrundingsfeil kan oppstå når vi bruker 64 bits heltall

**B:** 64 bits flyttall kan være vilkårlig små

**C:** Med 32 bits heltall kan vi representere tall av størrelse helt opp til  $2^{33}$

**D:** Vi kan representere større tall med 32 bits heltall enn med 64 bits flyttall

**E:** Både  $3/5$  og  $1/6$  kan representeres med endelige sifferutviklinger i 60-tallsystemet

**Oppgave 6.** Tallet

$$\frac{\ln(e^{(\pi+\pi^2)/\pi-1})}{\pi}$$

er det samme som

**A:**  $\ln \pi$

**B:**  $2\pi$

**C:**  $e$

**D:** 1

**E:**  $1/\pi$

**Oppgave 7.** En følge er definert ved  $x_n = (1 + 5n + n^2)/(1 + n^3)$  for  $n \geq 1$ . Hva er største nedre skranke for tallmengden gitt ved  $\{x_n \mid n \geq 1\}$ ?

**A:**  $1/2$

**B:** er ikke definert

**C:** 0

**D:** 1

**E:**  $-1/2$

**Oppgave 8.** Hva er Taylor-polynomet av grad 3 om  $a = 0$  for funksjonen  $f(x) = 1/(1+x)$ ?

**A:**  $1 + x + x^2 + x^3$

**B:**  $x + x^2$

**C:**  $1 - x + 2x^2 - 6x^3$

**D:**  $1 + x + x^2$

**E:**  $1 - x + x^2 - x^3$

**Oppgave 9.** Hva er Taylor-polynomet av grad 2 om  $a = 0$  for funksjonen  $f(x) = (\cos x)^2$ ?

**A:**  $1 - x + x^2$

**B:**  $1 - x$

**C:**  $1 - x^2$

**D:**  $1 + x^2/2$

**E:**  $1 - x^2$

**Oppgave 10.** For hvilken verdi av  $c$  blir Taylor-polynomet av grad 3 om  $a = 0$  for funksjonen  $f(x) = cx + \sin(x/c)$  lik  $-2x + x^3/6$ ?

**A:**  $c = 1$

**B:**  $c = 1/2$

**C:**  $c = -1$

**D:**  $c = 2$

**E:**  $c = -2$

**Oppgave 11.** For hvilken verdi av  $\beta$  har vi at  $1021_\beta = 136$ ?

**A:**  $\beta = 3$

**B:**  $\beta = 4$

**C:**  $\beta = 5$

**D:**  $\beta = 6$

**E:**  $\beta = 7$

**Oppgave 12.** Vi tilnærmer funksjonen  $f(x) = \cos x$  med sitt Taylor-polynom av grad  $n$  om  $a = 0$ . Hva er minste verdi av  $n$  som gjør at den absolutte feilen i tilnærmingen er mindre enn 0.001 for alle  $x$  i intervallet  $[0, 1]$ ?

**A:**  $n = 3$

**B:**  $n = 4$

**C:**  $n = 5$

**D:**  $n = 6$

**E:**  $n = 7$

**Oppgave 13.** Hvilket av følgende uttrykk vil gi stor relativ feil for minst en verdi av  $x$  når det beregnes på datamaskin ved hjelp av flyttall?

**A:**  $\ln x + (\cos x)^2$

**B:**  $x^3 + x^5$

**C:**  $x^2 + x^4$

**D:**  $x/((\sin x)^2 + x^2)$

**E:**  $1/2 + (\sin x)^2$

**Oppgave 14.** Differensligningen

$$x_{n+1} + ax_n = 6n^2, \quad n \geq 0$$

med startverdi  $x_0 = 0$  har løsningen  $x_n = 2n^3 - 3n^2 + n$ . Hva er da  $a$ ?

**A:**  $a = 0$

**B:**  $a = 1$

**C:**  $a = -1$

**D:**  $a = 3$

**E:**  $a = 2$

**Oppgave 15.** En annenordens lineær og homogen differensligning med konstante koeffisienter har den generelle løsningen

$$x_n = C2^{-n} + D.$$

Hva er da ligningen?

**A:**  $2x_{n+2} - 3x_{n+1} + x_n = 0$

**B:**  $2x_{n+2} + 3x_{n+1} - x_n = 0$

**C:**  $2x_{n+2} + x_{n+1} + 3x_n = 0$

**D:**  $2x_{n+2} - x_{n+1} + x_n = 0$

**E:**  $2x_{n+2} + 5x_{n+1} - x_n = 0$

**Oppgave 16.** Vi har gitt en differensligning med tilhørende startverdier,

$$x_{n+2} - x_{n+1} - 2x_n = 2^n, \quad n \geq 0, \quad x_0 = 1, \quad x_1 = -2/3.$$

Hva er løsningen?

**A:**  $x_n = \frac{1}{3}n2^n$

**B:**  $x_n = 2^n + 3(-1)^n$

**C:**  $x_n = n2^n + 2^n + (-1)^n$

**D:**  $x_n = -\frac{4}{3}n2^n + 2^n$

**E:**  $x_n = \frac{1}{6}n2^n + (-1)^n$

**Oppgave 17.** Vi har differensligningen

$$x_{n+1} - 6x_n = 1, \quad n \geq 1, \quad x_1 = -1/5$$

og simulerer denne med 64-bits flyttall på datamaskin. For tilstrekkelig store  $n$  vil da den beregnede løsningen  $\bar{x}_n$  gi et resultat som svarer til

- A: 0
- B:  $n$
- C:  $-1/5$
- D: overflow
- E: 1

**Oppgave 18.** Vi har differensligningen

$$x_{n+2} - \frac{5}{6}x_{n+1} + \frac{1}{6}x_n = 0, \quad x_0 = 1, \quad x_1 = 1/2$$

og simulerer denne med 64-bits flyttall. For  $n$  tilstrekkelig stor vil da den beregnede løsningen  $\bar{x}_n$  gi som resultat

- A: 0
- B:  $3^{-n}$
- C:  $2^{-n}$
- D:  $2^{-n} + 3^{-n}$
- E: overflow

**Oppgave 19.** En lineær, andreordens, inhomogen differensligning har den generelle løsningen

$$x_n = 1 + C3^n + D5^{-n}.$$

To startverdier gjør at løsningen blir  $x_n = 1 + 5^{-n}$ . Hvis denne ligningen simuleres på datamaskin med 64-bits flyttall vil, for tilstrekkelig store  $n$ , den beregnede løsningen  $\bar{x}_n$  gi som resultat

- A: 0
- B:  $1 + 5^{-n}$
- C:  $3^n$
- D: overflow
- E: 1

**Oppgave 20.** For hvert naturlig tall  $n \geq 0$  lar vi  $P_n$  betegne påstanden  $P_n$ :  $3^{n+2} + 2^{3n+1}$  er delelig med 5.

Et induksjonsbevis for at  $P_n$  er sann for alle naturlige tall  $n \geq 0$  kan være som følger:

1. Vi ser lett at  $P_0$  er sann.
2. Anta nå at vi har bevist at  $P_0, \dots, P_k$  er sanne. For å fullføre induksjonsbeviset, må vi vise at da er også  $P_{k+1}$  sann. Vi ser at

$$\begin{aligned} 3^{(n+1)+2} + 2^{3(n+1)+1} &= 3 \cdot 3^{n+2} + 8 \cdot 2^{3n+1} \\ &= 3 \cdot 3^{n+2} + 3 \cdot 2^{3n+1} - 3 \cdot 2^{3n+1} + 8 \cdot 2^{3n+1} \\ &= 3(3^{n+2} + 2^{3n+1}) + 5 \cdot 2^{3n+1}. \end{aligned}$$

Siden  $P_k$  er sann følger det at  $3(3^{n+2} + 2^{3n+1})$  er delelig med 5, og  $5 \cdot 2^{3n+1}$  er opplagt delelig med 5. Altså er summen også delelig med 5, og  $P_{k+1}$  er dermed også sann.

Hvilket av følgende utsagn er sant?

- A:** Påstanden  $P_n$  er sann for  $n \geq 0$ , men del 2 av induksjonsbeviset er feil
- B:** Påstanden  $P_n$  er ikke sann for alle  $n \geq 0$ , og del 2 av induksjonsbeviset er feil
- C:** Påstanden  $P_n$  er ikke sann for alle  $n \geq 0$ , og del 1 av induksjonsbeviset er feil
- D:** Påstanden  $P_n$  er riktig for alle  $n \geq 0$  og induksjonsbeviset er riktig
- E:** Beviset er riktig, men det er ikke noe induksjonsbevis

*Det var det!*