

i **Forside**

MAT-INF 1100 — Modellering og beregninger

Fredag 9. oktober 2020 kl 0900-1100

Vedlegg: Formelsamling (lenke ligger under linjen med oppgavenumre).

Tillatte hjelpemidler: ingen

De 10 første oppgavene teller 2 poeng hver, de 10 siste teller 3 poeng hver. Den totale poengsummen er altså 50. Det er 5 svaralternativer for hvert spørsmål, men det er bare ett av disse som er riktig. Dersom du svarer feil eller lar være å krysse av på et spørsmål, får du null poeng. Du blir altså ikke «straffet» med minuspoeng for å svare feil.

Lykke til!

1 Oppgave 1

Tallet 121 blir i 2-tallsystemet representert som

Velg ett alternativ

- 111001_2
- 1111001_2
- 1011001_2
- 1111010_2
- 1101001_2

Maks poeng: 2

2 Oppgave 2

Tallet **140.0625** blir i det heksadesimale siffersystemet representert som

Velg ett alternativ

- $8d.1_{16}$
- $8c.2_{16}$
- $8b.01_{16}$
- $8c.1_{16}$
- $8b.2_{16}$

Maks poeng: 2

3 Oppgave 3

Tallet **1.8** kan skrives i totallsystemet som

Velg ett alternativ

- $1.1101\ 1011\ 1011\ \dots_2$ der sifrene **1011** gjentas uendelig mange ganger
- 1.110111001_2
- 1.11011101110111011_2 er sifrene **1011** gjentas uendelig mange ganger
- 1.1100110011_2
- $1.110011001100110011\ \dots_2$ der sifrene **1001** gjentas uendelig mange ganger

Maks poeng: 2

4 Oppgave 4

Hvilket av følgende tall vil ha en sifferutvikling som verken er endelig og heller ikke består av en gruppe av repeterende sifre?

Velg ett alternativ

- $1/3$
- Den positive løsningen av ligningen $100x^2 = 1$
- $1/2$
- Den positive løsningen av ligningen $x^3 = 27$
- Den positive løsningen av ligningen $x^2 = 2$

Maks poeng: 2

5 Oppgave 5

Utrykket $(3 + z)^8$ kan også skrives som $\sum_{k=0}^8 b_k z^k$ hvor hver av b_k 'ene er heltall. Hvilket heltall er b_6 ?

Du kan få bruk for at binomialkoeffesientene er gitt ved: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Velg ett alternativ

- $b_6 = 28$
- $b_6 = 56$
- $b_6 = 252$
- $b_6 = -24$
- $b_6 = 24$

Maks poeng: 2

6 Oppgave 6

Ett av følgende utsagn er sanne.

Summen av to irrasjonale tall

Velg ett alternativ

- kan bli et komplekst tall
- kan bli et rasjonalt tall
- er alltid et rasjonalt tall
- er alltid et irrasjonalt tall
- kan bli uendelig

Maks poeng: 2

7 Oppgave 7

Minste øvre skranke i \mathbb{R} for mengden

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x/100 < 1\}$$

er

Velg ett alternativ

- 100
- ikke definert
- 99
- 1/99
- 1/100

Maks poeng: 2

8 Oppgave 8

Hvilket av følgende utsagn er **usant**.

Velg ett alternativ

- Med 64 bits flyttall kan vi representere reelle tall med 64 riktige, desimale sifre
- Avrundingsfeil er ikke et problem når vi arbeider med heltall på datamaskin
- Et tall av størrelsesorden 10^{50} gir ikke overflow når vi arbeider med 64 bits flyttall
- Tallet $1/32$ kan representeres eksakt med 64-bits flyttall
- 64-bits flyttall representeres med ca. 15-17 siffrers nøyaktighet i signifikanden (i det desimale tallsystemet)

Maks poeng: 2

9 Oppgave 9

For hvilken verdi av β er ligningen $7_\beta + 117_\beta = 121_\beta$ riktig (alle tall er representert i β -tallsystemet)?

Velg ett alternativ

- 10
- 14
- 13
- 11
- 12

Maks poeng: 2

10 Oppgave 10

Ett av følgende utsagn om absolutt og relativ feil er sant, hvilket?

Velg ett alternativ

- Den relative feilen kan være ubegrenset
- Vi kan alltid finne den relative feilen om vi kjenner den absolutte feilen
- Den absolutte feilen kan være ubegrenset
- Den relative feilen er alltid mindre enn den absolutte feilen
- Den absolutte feilen er alltid mindre enn den relative feilen

Maks poeng: 2

11 Oppgave 11

En tekst med 100 tegn blir lagret som 111 bytes. Hvilken koding er da brukt?

Velg ett alternativ

- 7-bits ASCII
- Ingen av de andre alternativene er riktige
- UTF-8
- ISO Latin-1
- UTF-32

Maks poeng: 3

12 Oppgave 12

Hvilket av følgende uttrykk vil gi stor relativ feil om det evalueres for svært store positive flyttall (vi antar at vi ikke får overflow)?

Velg ett alternativ

- $x^5 - x^3$
- $x^3 + x^5$
- $\frac{1}{x^2 - \sqrt{1+x}}$
- $\ln(x+1) - \ln(x)$
- $x^2 - 1$

Maks poeng: 3

13 Oppgave 13

Hvilken av følgende differensligninger er lineær, homogen og av andre orden?

Velg ett alternativ

- $x_{n+2} - x_{n+1}x_n = 0$
- $x_{n+1} + 3x_n = 0$
- $x_{n+2} - x_n = 3 - \sin n$
- $x_{n+2} + 2n^2x_{n+1} - x_n = 0$
- $x_{n+2} - x_{n+1} - x_n = -1$

Maks poeng: 3

14 Oppgave 14

Differensligningen

$$x_{n+1} - 3x_n = -3^n, \quad n \geq 0,$$

med startverdi $x_0 = 1$ har løsningen

Velg ett alternativ

- $x_n = 3^n$
- $x_n = 1 - 3^n$
- $x_n = 3^n(1 + n/3)$
- $x_n = 1 - 3n$
- $x_n = 3^n(1 - n/3)$

Maks poeng: 3

15 Oppgave 15

Differensligningen

$$x_{n+1} - 2(n+1)x_n = 0, \quad n \geq 0$$

med startverdi $x_0 = 1$ har løsning

Velg ett alternativ

- $x_n = 2^n n!$
- $x_n = 2^n (n+1)^n$
- $x_n = 2^{n+1} (n+1)$
- $x_n = 2^n (n+1)$
- $x_n = 2^{n+1} (n+1)!$

Maks poeng: 3

16 Oppgave 16

Differensligningen

$$x_{n+2} + 4x_{n+1} - 12x_n = 0$$

har generell løsning

Velg ett alternativ

- $x_n = C2^n + D(-6)^n$
- $x_n = C2^n + D3^n$
- $x_n = C + D3^n$
- $x_n = C + D(-3)^n$
- $x_n = C(-4)^n + D(12)^n$

Maks poeng: 3

17 Oppgave 17

Differensligningen

$$x_{n+2} + x_{n+1} - 6x_n = 42(4^n)$$

med initialbetingelser $x_0 = 8$ og $x_1 = 2$ har løsningen

Velg ett alternativ

- $x_n = (26/5)(2^n) + (14/5)(-3)^n$
- $x_n = 6(-2)^n + 2(3^n)$
- $x_n = 2(2^n) + 4^n + 3n(4^n)$
- $x_n = 6(2^n) + 2(-3)^n + 3n(4^n)$
- $x_n = 2^n + 4(-3)^n + 3(4^n)$

Maks poeng: 3

18 Oppgave 18

Differensligningen

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 3n + 3$$

har generell løsning

Velg ett alternativ

- $x_n = 2^n(C \cos(n\pi/3) + D \sin(n\pi/3)) + 2n + 2$
- $x_n = C \cos(n\pi/3) + D \sin(n\pi/3) + n + 1$
- $x_n = C2^n + D(-2)^n + 3n + 3$
- $x_n = C \cos(n\pi/3) + D \sin(n\pi/3) + 2n + 2$
- $x_n = 2^n(C \cos(n\pi/3) + D \sin(n\pi/3)) + n + 1$

Maks poeng: 3

19 Oppgave 19

Vi simulerer differensligningen

$$3x_{n+2} - 7x_{n+1} + 2x_n = -2, \quad n \geq 0$$

med startverdiene $x_0 = 0$ og $x_1 = -2/3$ på en datamaskin med 64-bits flyttall. For store nok n vil den beregnede løsningen x_n bli

Velg ett alternativ

- $C2^n$ for en passende konstant C og deretter overflow
- $C3^{-n}$ for en passende konstant C ulik 0
- -1
- Den eksakte løsningen pluss en liten avrundingsfeil
- 0

Maks poeng: 3

20 Induksjon

Vi har differensligningen

$$x_n = x_{n-1}/x_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad x_0 = 1, x_1 = 2.$$

Vi lar nå P_n betegne påstanden

$$P_n : x_n \text{ er enten } 1 \text{ eller } 2.$$

Et induksjonsbevis for at P_n er sann for alle heltall $n \geq 0$ kan være som følger:

1. Vi ser lett at P_0 og P_1 er sanne.
2. Anta nå at vi har bevist at P_0, \dots, P_k er sanne. For å fullføre induksjonsbeviset, må vi vise at P_{k+1} også er sann. Fra induksjonshypotesen vet vi at både x_{k-1} og x_k er enten 1 eller 2 så $x_{k+1} = x_k/x_{k-1}$ er også enten 1 eller 2. Altså er også P_{k+1} sann.

Hvilket av følgende utsagn er sant?

Velg ett alternativ

- Påstanden P_n er sann for alle $n \geq 0$, induksjonsbeviset er riktig
- Påstanden P_n er ikke sann for alle $n \geq 0$, og det er en feil i del 2
- Påstanden P_n er sann for $n \geq 0$, men del 2 av induksjonsbeviset er feil
- Beviset er riktig, men det er ikke et induksjonsbevis
- Påstanden P_n er ikke sann for alle $n \geq 0$, og det er en feil i del 1

Maks poeng: 3