

# FORMELSAMLING FOR MAT 1050

## Derivasjonsregler

**Spesielle:**  $(x^n)' = nx^{n-1}$   
 $(a^x)' = a^x \ln a$  spesielt  $(e^x)' = e^x$   $(\ln x)' = \frac{1}{x}$   
 $(\sin x)' = \cos x$   $(\cos x)' = -\sin x$   $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

**Generelle:**  $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$   
 $(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$   
 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$   
 $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

## Spesielle funksjoner

**Eksponensialfunksj.:**  $a^x a^y = a^{x+y}$   $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$   $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$   $(a^x)^y = a^{xy}$

**Logaritmer:**  $\ln(xy) = \ln x + \ln y$   $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$   
 $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$   $\ln(x^a) = a \ln x$

**Trigonometriske:**  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$   
 $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$   
 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$   
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$   $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$   
 $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$   $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

**Eksakte verdier:**

$v$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin v$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos v$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\tan v$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	-

## Integrasjonsregler

**Spesielle:**  $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$   $n \neq -1$   $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$ ,  $x > 0$   
 $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$  spesielt  $\int e^x dx = e^x + C$   
 $\int \sin x dx = -\cos x + C$   $\int \cos x dx = \sin x + C$

**Generelle:**  $\int f(x) + g(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$   
 $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$   
 $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + C$

## Komplekse tall

**Skrivemåter:**  $z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$

**Komplekskonjugert:**  $\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$

**abc-formelen:**  $x^2 + bx + c = 0$  gir  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$

**Eksponentialfunksjonen:**  $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$

## Funksjoner av flere variable

**Gradient:**  $\nabla f(\mathbf{x}) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right)$

**Kjerneregul:** For  $h(t) = f(\mathbf{x}(t))$ ,

$$\frac{\partial h}{\partial t}(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}(t)) \cdot x'_1(t) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}(t)) \cdot x'_n(t) = \nabla f(\mathbf{x}(t)) \cdot \mathbf{x}'(t)$$

**Annenderiverttest:** Anta at  $(a, b)$  er et stasjonært punkt og la  $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)$ ,

$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ ,  $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$ ,  $D = AC - B^2$ . Da gjelder

i) Hvis  $D < 0$ , er  $(a, b)$  et sadelpunkt.

ii) Hvis  $D > 0$  og  $A > 0$ , er  $(a, b)$  et lokalt minimum.

iii) Hvis  $D > 0$  og  $A < 0$ , er  $(a, b)$  et lokalt maksimum.

**Lagranges multiplikator metode:**  $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ ,  $g(x, y) = c$ .

## Numeriske formler

**Taylor's formel:**  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$

## Parametriserte kurver og linjeintegraler

**Tangent:**  $\mathbf{T}(t) = \mathbf{r}'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$

**Buelengde:**  $s = L(a, b) = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{x'_1(t)^2 + x'_2(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2} dt$

**Linjeintegral av funksjon:**  $\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{x'_1(t)^2 + x'_2(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2} dt$

**Linjeintegral av vektorfelt:**  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{T}_C(t) dt$

**Integral av gradient:**  $\int_C \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a})$

**Sirkulasjon av plant vektorfelt  $\mathbf{F} = (P, Q)$ :**  $\text{curl}(\mathbf{F}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$

**Nødvendig betingelse for konservativt felt:**  $\text{curl}(\mathbf{F}) = 0$ .

## Multiple integraler

**Polarkoordinater:**  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,

$$\iint_{D(x,y)} f dx dy = \iint_{D(r,\theta)} f r dr d\theta$$

**Areal og tyngdepunkt:**  $A = \iint_D 1 dx dy$

$$\bar{x}A = \iint_D x dx dy \quad \bar{y}A = \iint_D y dx dy$$

**Greens teorem:**  $\iint_R \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_C P dx + Q dy$

## Dynamiske systemer

**System:**  $x'(t) = ax + by + e$ ,  $y'(t) = cx + dy + f$

**Diskriminant:**  $\mathcal{D} = (a - d)^2 + 4bc$

**Eigenverdier:**  $\lambda = \frac{a+d \pm \sqrt{\mathcal{D}}}{2}$

**Type likevektspunkt:** For  $\mathcal{D} < 0$ :  $\alpha = \frac{a+d}{2}$ ,  $\beta = \frac{\sqrt{\mathcal{D}}}{2}$ :

$\mathcal{D} > 0$ ,  $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ : frastøtende likevektspunkt

$\mathcal{D} > 0$ ,  $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ : tiltrekkende likevektspunkt

$\mathcal{D} > 0$ ,  $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ : bifurkasjon, én tiltrekkende linje

$\mathcal{D} < 0$ ,  $\alpha > 0$ : utoverrettet spiral

$\mathcal{D} < 0$ ,  $\alpha < 0$ : innoverrettet spiral

$\mathcal{D} < 0$ ,  $\alpha = 0$ : bifurkasjon med periodiske stabile baner utenfor likevektspunktet

**Generell løsning** av det homogene systemet  $x'(t) = ax + by$ ,  $y'(t) = cx + dy$ :

$$x(t) = Ce^{\lambda_1 t} + De^{\lambda_2 t}$$

$$y(t) = \frac{\lambda_1 - a}{b} Ce^{\lambda_1 t} + \frac{\lambda_2 - a}{b} De^{\lambda_2 t}$$