

FORMELSAMLING FOR MAT 1050

Derivasjonsregler

Spesielle: $(x^n)' = nx^{n-1}$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad \text{spesielt} \quad (e^x)' = e^x \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

Generelle: $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

$$(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Spesielle funksjoner

Eksponensialfunksj.: $a^x a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad (a^x)^y = a^{xy}$

Logaritmer: $\ln(xy) = \ln x + \ln y \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$

$$\ln\frac{1}{x} = -\ln x \quad \ln(x^a) = a \ln x$$

Trigonometriske:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Eksakte verdier:

v	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin v$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos v$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan v$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	—

Integrasjonsregler

Spesielle: $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad n \neq -1 \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, x > 0$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C \quad \text{spesielt} \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

Generelle: $\int f(x) + g(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

$$\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + C$$

Komplekse tall

Skrivemåter: $z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$

Komplekskonjugert: $\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$

abc-formelen: $x^2 + bx + c = 0$ gir $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$

Eksponentialfunksjonen: $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$

Funksjoner av flere variable

Gradient: $\nabla f(\mathbf{x}) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}))$

Kjerneregel: For $h(t) = f(\mathbf{x}(t))$,

$$\frac{\partial h}{\partial t}(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}(t)) \cdot x'_1(t) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}(t)) \cdot x'_n(t) = \nabla f(\mathbf{x}(t)) \cdot \mathbf{x}'(t)$$

Annenderiverttest: Anta at (a, b) er et stasjonært punkt og la $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)$,

$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$, $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$, $D = AC - B^2$. Da gjelder

- i) Hvis $D < 0$, er (a, b) et sadelpunkt.
- ii) Hvis $D > 0$ og $A > 0$, er (a, b) et lokalt minimum.
- iii) Hvis $D > 0$ og $A < 0$, er (a, b) et lokalt maksimum.

Lagranges multiplikatormetode: $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$, $g(x, y) = c$.

Numeriske formler

Taylors formel: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$

Parametriserte kurver og linjeintegraler

Tangent: $\mathbf{T}(t) = \mathbf{r}'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$

Buelengde: $s = L(a, b) = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{x'_1(t)^2 + x'_2(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2} dt$

Linjeintegral av funksjon: $\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{x'_1(t)^2 + x'_2(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2} dt$

Linjeintegral av vektorfelt: $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$

Integral av gradient: $\int_C \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a})$

Sirkulasjon av plant vektorfelt $\mathbf{F} = (P, Q)$: $\text{curl}(\mathbf{F}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$

Nødvendig betingelse for konservativt felt: $\text{curl}(\mathbf{F}) = 0$.

Multiple integraler

Polarcoordinater: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

$$\iint_{D(x,y)} f dx dy = \iint_{D(r,\theta)} fr dr d\theta$$

Areal og tyngdepunkt: $A = \iint_D 1 dx dy$

$$\bar{x}A = \iint_D x dx dy \quad \bar{y}A = \iint_D y dx dy$$

Greens teorem: $\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_C P dx + Q dy$

Dynamiske systemer

System: $x'(t) = ax + by + e, y'(t) = cx + dy + f$

Diskriminant: $\mathcal{D} = (a - d)^2 + 4bc$

Egenverdier: $\lambda = \frac{a+d \pm \sqrt{\mathcal{D}}}{2}$

Type likevektspunkt: For $\mathcal{D} < 0$: $\alpha = \frac{a+d}{2}, \beta = \frac{\sqrt{\mathcal{D}}}{2}$:

$\mathcal{D} > 0, \lambda_1, \lambda_2 > 0$: frastøtende likevektspunkt

$\mathcal{D} > 0, \lambda_1, \lambda_2 < 0$: tiltrekkende likevektspunkt

$\mathcal{D} > 0, \lambda_2 < 0 < \lambda_1$: bifurkasjon, én tiltrekkende linje

$\mathcal{D} < 0, \alpha > 0$: utoverrettet spiral

$\mathcal{D} < 0, \alpha < 0$: innoverrettet spiral

$\mathcal{D} < 0, \alpha = 0$: bifurkasjon med periodiske stabile baner utenfor likevektspunktet

Generell løsning av det homogene systemet $x'(t) = ax+by, y'(t) = cx+dy$:

$$x(t) = Ce^{\lambda_1 t} + De^{\lambda_2 t}$$
$$y(t) = \frac{\lambda_1 - a}{b}Ce^{\lambda_1 t} + \frac{\lambda_2 - a}{b}De^{\lambda_2 t}$$