

# UNIVERSITETET I OSLO

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i:	MAT3300/4300/9300 — Mål- og integrasjonsteori.
Eksamensdag:	Tirsdag, 2. desember, 2008.
Tid for eksamen:	14.30 – 17.30.
Oppgavesettet er på	3 sider.
Vedlegg:	Ingen.
Tillatte hjelpemidler:	Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Alle svarene må begrunnes.

**Oppgave 1** La  $X = [0, 2]$  og la  $\lambda$  være Lebesguemålet på  $\sigma$ -algebraen  $\mathbb{X}$  av Lebesguemålbare delmengder av  $X$ .

La

$$\mu(E) = \int_E x^3 d\lambda$$

for  $E \in \mathbb{X}$ .

La  $g(x) = x^4$  på  $X$ .

Finn

$$\int g d\mu.$$

### Oppgave 2

- a) La  $(X, \mathbb{X})$  være et målbart rom og la  $\lambda$  være et fortegnsmål (charge) på  $\mathbb{X}$ .

Forklar hva vi mener med en *Hahndekomposisjon* og en *Jordandekomposisjon* av  $\lambda$ , og sammenhengen mellom disse begrepene.

Nå, la  $X = [1, \infty]$ , la  $\mathbb{X}$  være  $\sigma$ -algebraen av Borelmengder i  $X$  og la  $\mu$  være Lebesguemålet på  $\mathbb{X}$ .

(Fortsettes side 2.)

La

$$\lambda(E) = \sum_{n=1}^{\infty} (-n)^{-n} \mu(E \cap [n, n+1]).$$

Vis at  $\lambda$  er et fortegnsmål ved å finne en Hahndekomposisjon og Jordandekomposisjonen til  $\lambda$ .

- b) Formuler Lebesgues dekomposisjonsteorem og forklar hva vi mener med  $\perp$  and  $\ll$ .

Finn Lebesguedekomposisjonen til  $\mu$  med hensyn på  $\lambda^+$ , hvor  $\lambda^+$  er avledet fra  $\lambda$  i a).

**Oppgave 3** La  $X$  være enhetsintervallet  $[0, 1]$ , la  $\mathbb{X}$  være  $\sigma$ -algebraen av Lebesguemålbare delmengder av  $X$  og la  $\lambda$  være Lebesguemålet på  $\mathbb{X}$ .

La  $\mu$  være produktmålet

$$\mu = \lambda \times \lambda$$

på  $X \times X$ .

- a) Vis at ethvert rett linjestykke, sett som en delmengde av  $X \times X$ , vil være  $\mu$ -målbar og ha  $\mu$ -mål 0.

- b) La  $F : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  være definert ved

$$F(x, y) = |x^2 - y|.$$

Vis at  $F$  er  $\mu$ -integrerbar og beregn

$$\int F d\mu.$$

- c) For hver  $n \in \mathbb{N}$ , la

$$F_n(x, y) = \left| \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{n}\right) \right|$$

hvis  $x$  er irrasjonal,

$$F_n(x, y) = x^{\frac{1}{n}} y^n$$

hvis  $x \in \mathbb{Q}$ .

Finn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int F_n d\mu.$$

**Oppgave 4** La  $X$  være en mengde, og la  $\mathbb{Z}_0$  være en tellbar algebra av delmengder av  $X$ .

Vi sier at  $\mathbb{Z}_0$  er *kompakt* hvis det hver gang

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

med  $E$  og hver  $E_n$  i  $\mathbb{Z}_0$ , finnes en  $k \in \mathbb{N}$  slik at

$$E = \bigcup_{n=1}^k E_n.$$

- a) Vis at hvis  $\mathbb{Z}_0$  er en kompakt algebra på  $X$ , så vil enhver endelig additiv funksjon

$$\mu : \mathbb{Z}_0 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

ha en entydig utvidelse til et mål  $\mu^*$  på  $\sigma$ -algebraen  $\mathbb{Z}$  generert fra  $\mathbb{Z}_0$ , hvor  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  betegner de ikke-negative reelle tallene.

Nå, la  $X$  være mengden av funksjoner  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ .

Hvis

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

er en endelig sekvens fra  $\{0, 1\}$ , la

$$B_\sigma = \{\alpha \in X \mid \alpha(i) = a_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}.$$

La  $\mathbb{X}_0$  være mengden av endelige unioner

$$B_{\sigma_1} \cup \dots \cup B_{\sigma_k}$$

hvor hver  $\sigma_j$  er en endelig sekvens fra  $\{0, 1\}$ .

Som konvensjon lar vi  $X = B_e$  hvor  $e$  er den tomme sekvensen, og vi lar  $\emptyset$  være unionen over når  $k = 0$ .

- b) Vis at  $\mathbb{X}_0$  er en algebra.  
 c) La  $\mathbb{X}$  være den minste  $\sigma$ -algebraen som utvider  $\mathbb{X}_0$ .  
 Vis at det finnes ett og bare ett mål  $\mu$  på  $\mathbb{X}$  slik at vi for alle  $n \in \mathbb{N}$  har at

$$\mu(B_\sigma) = 2^{-n}$$

når  $\sigma = (a_1, \dots, a_n)$  er en sekvens av lengde  $n$ .

SLUTT