

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Eksamen i: STK1100 — Sannsynlighetsregning
og statistisk modellering.
Eksamensdag: Fredag 8. juni 2012.
Tid for eksamen: 14.30–18.30.
Oppgavesettet er på 2 sider.
Vedlegg: Ingen
Tillatte hjelpemidler: Godkjent lommeregner og Formel-
samling for STK1100 og STK1110.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1

Ved en bestemt butikk i en større dagligvarekjede viser langvarige data at 30% av kundene handler for mindre enn kr. 500, 40% av kundene handler for kr. 500 eller mer men mindre enn kr. 1000, mens de resterende 30% av kundene handler for kr. 1000 eller mer. Videre viser dataene at henholdsvis 40%, 70% og 90% av kundene i de tre gruppene kommer i bil.

- Innfør en passende notasjon for de fire begivenhetene over og uttrykk prosenttallene som passende tilhørende sannsynligheter.
- Hva er sannsynligheten for at neste kunde handler for mindre enn kr. 500 og kommer i bil?
- Hva er sannsynligheten for at neste kunde kommer i bil?
- Anta vi ser at neste kunde kommer i bil. Hva er sannsynlighetene for at vedkommende handler for henholdsvis mindre enn kr. 500, kr. 500 eller mer men mindre enn kr. 1000, kr. 1000 eller mer?

Oppgave 2

Lederen for butikken er interessert i hvor lenge den enkelte kunde er der. Innfør følgende tilfeldige variabel:

X = Antall minutter en tilfeldig valgt kunde oppholder seg i butikken.

(Fortsettes på side 2.)

Ut fra noen data har en kommet frem til at X er uniformt $[0, \theta]$ fordelt, der θ er en ukjent parameter. Sannsynlighetstettheten til X er da gitt ved:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{ellers} \end{cases} \quad (1)$$

- a) Vis at $EX = \theta/2$ og $V(X) = \theta^2/12$.
- b) Anta at X_1, \dots, X_n er n uavhengige tilfeldige variable, svarende til n kunder som oppholder seg i butikken, hver med samme sannsynlighetstetthet som X . La $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Beregn $E\bar{X}$ og $V(\bar{X})$.

- c) Foreslå en forventningsrett estimator for θ . Begrunn svaret. Hva er estimatorens varians?
- d) Anta $n = 192$. Bruk sentralgrenseteoremet til å bestemme en tilnærmet verdi for sannsynligheten $P(\bar{X} \leq 20)$ uttrykt ved θ . Kommenter resultatet for $\theta = 40$.
- e) Anta fortsatt at $n = 192$ og at $\bar{x} = \frac{1}{192} \sum_{i=1}^{192} x_i = 20$ der x_1, \dots, x_{192} er de observerte verdiene av X_1, \dots, X_{192} . Finn et tilnærmet 95% konfidensintervall for θ . Bruk at for $Z \sim N(0, 1)$ er $P[Z \leq -1.96] = 0.025$.
- f) Vis at den momentgenererende funksjonen til X er gitt ved:

$$M_X(t) = Ee^{tX} = \begin{cases} \frac{e^{\theta t} - 1}{\theta t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases} \quad (2)$$

- g) Anta at X_1 og X_2 er 2 uavhengige tilfeldige variable, svarende til 2 kunder som oppholder seg i butikken, hver med samme sannsynlighetstetthet som X . La $V = X_1 + X_2$. Butikksjefen lurer på hva sannsynlighetstettheten til V er og spør en student i STK1100 om å beregne denne. Neste dag kommer studenten med følgende forslag:

$$f_V(v) = \begin{cases} \frac{v}{\theta^2} & 0 \leq v \leq \theta \\ \frac{2\theta - v}{\theta^2} & \theta \leq v \leq 2\theta \end{cases} \quad (3)$$

Beregn EV ved å benytte uttrykket for $f_V(v)$. Tyder svaret på at studenten har regnet riktig? Begrunn svaret.

- h) Beregn den momentgenererende funksjonen $M_V(t)$ ved å benytte uttrykket for $f_V(v)$. Kommenter resultatet.

SLUTT