

# UNIVERSITETET I OSLO

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamensdato: STK2400 — Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse.

Eksamensdag: Onsdag 6. desember 2006.

Tid for eksamen: 15.30 – 18.30.

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpeemidler: Godkjent kalkulator.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

### Oppgave 1.

I denne oppgaven skal vi se på en type system som kalles et terskelsystem. Et binært monoton system,  $(C, \phi)$ , med komponentmengde  $C = \{1, \dots, n\}$  og strukturfunksjon  $\phi$ , sies å være et *terskelsystem* dersom strukturfunksjonen kan skrives på følgende form:

$$(1) \quad \phi(\mathbf{X}) = I\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \geq b\right),$$

der  $a_1, \dots, a_n$  og  $b$  er ikke-negative konstanter, og  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  betegner vektoren av komponent-tilstandsvariable. Funksjonen  $I(\cdot)$  betegner indikatorkfunksjonen, dvs.  $I(A) = 1$  dersom kriteriet  $A$  er oppfylt, og 0 ellers. Konstantene  $a_1, \dots, a_n$  kalles for systemets komponentvekter, mens konstanten  $b$  kalles systemets terskelverdi.

- (a) La  $(C, \phi)$  være et terskelsystem der alle komponentvektene er lik 1 og der terskelverdien er lik  $k$ , der  $k$  er et heltall slik at  $1 \leq k \leq n$ . Hva slags system er dette?

(Fortsettes side 2.)

(b) La  $(C, \phi_1)$  og  $(C, \phi_2)$  være to terskelsystemer med felles komponentvekter  $a_1, \dots, a_n$  som alle er positive, og med terskelverdier henholdsvis  $b_1$  og  $b_2$  gitt ved:

$$(2) \quad b_1 = \sum_{i=1}^n a_i$$

$$(3) \quad b_2 = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

Hva slags systemer er  $(C, \phi_1)$  og  $(C, \phi_2)$ ?

(c) La  $(C, \phi)$  være et terskelsystem og la  $(C, \phi^D)$  betegne det duale systemet. Vis at  $(C, \phi^D)$  også er et terskelsystem.

I resten av denne oppgaven lar vi  $(C, \phi_b)$  betegne et terskelsystem der  $C = \{1, \dots, 5\}$ ,  $b \in \{1, \dots, 8\}$ , og der:

$$(4) \quad \phi_b(\mathbf{X}) = I(3X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \geq b).$$

Videre betegner vi påliteligheten til  $(C, \phi_b)$  med  $h_b$ .

(d) Finn de minimale sti- og kuttmengdene til  $(C, \phi_3)$ .

(e) Vis at:

$$(5) \quad \phi_3(1_1, \mathbf{X}) = 1,$$

$$(6) \quad \phi_3(0_1, \mathbf{X}) = X_2(X_3 \coprod X_4 \coprod X_5) + (1 - X_2)(X_3 X_4 X_5).$$

(f) Anta at  $X_1, \dots, X_5$  er stokastisk uavhengige og at  $\Pr(X_i = 1) = p_i$ ,  $i = 1, \dots, 5$ . La videre  $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_5)$ . Finn påliteligheten  $h_3 = h_3(\mathbf{p})$  til systemet  $(C, \phi_3)$ .

(g) Birnbaum-målet for den pålitelighetsmessige betydning av  $i$ -te komponent i systemet  $(C, \phi_b)$  er definert som:

$$(7) \quad I_B^i(\phi_b) = \frac{\partial h_b(\mathbf{p})}{\partial p_i}, \quad i = 1, \dots, 5.$$

Beregn  $I_B^1(\phi_3)$ .

(h) Anta at  $p_1 < \dots < p_5$ . Hvilken komponent har høyest pålitelighetsmessig betydning i  $(C, \phi_1)$ ? Hva er den tilsvarende konklusjonen dersom vi istedet ser på  $(C, \phi_8)$ ? Kommenter svaret.

(i) I resten av oppgaven antar vi at  $p_1 = \dots = p_5 = p$ , og innfører:

$$(8) \quad S = 3X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4 + X_5.$$

Forklar kort hvorfor  $S \in \{0, 1, \dots, 8\}$ . Finn sannsynlighetsfordelingen til  $S$  uttrykt ved  $p$ .

(Fortsettes side 3.)

(j) Forklar hvorfor:

$$(9) \quad h_b = h_b(p) = \Pr(S \geq b), \quad b = 1, \dots, 8,$$

og benytt dette til å finne  $h_5$ .

(k) For hvilke verdier av  $b$  vil  $h_b(p) \geq p$  for alle  $p \in [0, 1]$ ? For hvilke verdier av  $b$  vil  $h_b(p) \leq p$  for alle  $p \in [0, 1]$ ? Begrunn svaret.

## Oppgave 2.

Definer hva det vil si at stokastiske variable  $T_1, \dots, T_n$  er *assosiert*. Gi en kort beskrivelse av hvordan dette begrepet kan brukes i pålitelighetsanalyse.

SLUTT