

MAT0100V

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Urdnede utvalg uten tilbakelegging Pascals talltrekant og binomialkoeffisientene

Ørnulf Borgan
Matematisk institutt
Universitetet i Oslo

1

Ulike typer utvalg

Eksempel 6.3: Vi skriver bokstavene i alfabetet på hver sin lapp og legger de 29 lappene i en eske

Vi trekker så fire lapper, én etter én

Vi sier at vi trekker et *utvalg* på fire bokstaver

Hvis vi legger en lapp tilbake før vi trekker den neste, trekker vi *med tilbakelegging*

Hvis vi *ikke* legger lappen tilbake, trekker vi *uten tilbakelegging*

Hvis rekkefølgen bokstavene trekkes i har betydning, trekker vi et *ordnet utvalg*

Hvis rekkefølgen *ikke* har betydning, trekker vi et *uordnet utvalg*

2

Ordnet utvalg uten tilbakelegging

Se på bokstaveksempelen

Vi trekker 4 bokstaver uten tilbakelegging

- Første gang er det 29 bokstaver å velge mellom
- Andre gang er det 29-1 bokstaver å velge mellom
- Tredje gang er det 29-2 bokstaver å velge mellom
- Fjerde gang er det 29-3 bokstaver å velge mellom

Vi kan velge de fire bokstavene på

$$29 \cdot (29 - 1) \cdot (29 - 2) \cdot (29 - 3) = 570024$$

forskjellige måter når vi tar hensyn til rekkefølgen

3

Generelt har vi en mengde med n elementer, og vi velger r elementer fra mengden *uten tilbakelegging*

Da kan vi lage

$${}_n P_r = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots (n - r + 1)$$

r faktorer

ordnede utvalg

4

Eksempel 6.5:

Landslagstreneren i langrenn for menn har sju løpere å velge mellom til en World Cup stafett over 4x10 km



På hvor mange måter kan han sette opp stafett-laget når vi tar hensyn til hvem som skal gå de ulike etappene?

Treneren kan sette opp stafettlaget på

$${}_7P_4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$$

måter

5

Vi har fortsatt en mengde med n elementer, og vi velger r elementer fra mengden uten tilbakelegging

Når $r = n$ velger vi alle elementene.

Da svarer et ordnet utvalg til en bestemt rekkefølge (eller permutasjon) av de n elementene

Det er

$$n! = {}_n P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$$

slike rekkefølger

Merk at vi setter $0! = 1$

6

Eksempel 6.6:

Vi ser på eksempel 6.5. Treneren har bestemt seg for hvilke fire løpere som skal gå stafetten

Hvor mange lagoppstillinger kan han da velge mellom?

Treneren kan velge mellom

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

lagoppstillinger

7

Uordnet utvalg uten tilbakelegging

Eksempel 6.7: Vi ser igjen på stafetteksempellet

På hvor mange måter kan treneren velge ut de 4 som skal gå stafetten (blant de 7) når vi *ikke* bryr oss om hvem som skal gå de ulike etappene?

La x være antall måter han kan gjøre det på

Merk at x er antall *uordnede* utvalg av 4 løpere blant 7 når utvelgingen skjer uten tilbakelegging

Vi vil bestemme x ved å finne antall *ordnede* utvalg på to måter

8

Fra eksempel 6.5 har vi at antall ordnede utvalg av 4 løpere blant 7 løpere er ${}_7P_4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$

Fra ett uordnet utvalg kan lage $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ ordnede utvalg (jf eksempel 6.6)

Vi kan derfor lage $x \cdot 4!$ ordnede utvalg

Dermed er $x \cdot 4! = {}_7P_4$

$$\text{Dette gir } x = \frac{{}_7P_4}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 35$$

Treneren kan velge ut de som skal gå stafetten på 35 måter når vi ikke bryr oss om hvem som skal gå de ulike etappene

9

Generelt har vi en mengde med n elementer, og vi velger r elementer fra mengden **uten tilbakelegging**

Da kan vi lage

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1)}{1 \cdot 2 \cdots (r-1) \cdot r}$$

uordnede utvalg

NB! For uordnet utvalg spiller det ingen rolle om vi velger ett element om gangen, eller om vi velger alle på en gang

10

Eksempel 6.8:

En klasse har 25 elever

Fire elever skal velges til en festkomité

Hvor mange måter kan det gjøres på?



De 4 elevene kan velges på

$${}_{25}C_4 = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 12650$$

måter

11

Oppgave 55 I en klasse er det 25 elever. De skal velge to medlemmer til elverådet. Hvor mange måter kan de gjøre det på?

Antall måter de to medlemmene kan velges på er:

$${}_{25}C_2 = \frac{25 \cdot 24}{1 \cdot 2} = 300$$

Oppgave 56 Et lokallag til et politisk parti har 40 medlemmer. Lokallaget skal velge tre delegater til partiets landsmøte. Hvor mange måter kan de velge delegatene på?

Antall måter de tre delegatene kan velges på er:


$${}_{40}C_3 = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 9880$$

12

GeoGebra

Vi kan bruke GeoGebra til å bestemme ${}_n C_r$

Illustrasjon for ${}_{25}C_2$ og ${}_{40}C_3$



13

Eksempel 6.9:



Når du tipper én lottorekke, krysser du av sju tall fra 1 til 34

Hvor mange lotto-rekker fins det?

Hva er sannsynligheten for å vinne førstepremie hvis du tipper én rekke?

Antall mulige lottorekker:

$${}_{34}C_7 = \frac{34 \cdot 33 \cdot 32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = 5379616$$

Sannsynligheten for å vinne førstepremie:

$$P(\text{førstepremie}) = \frac{1}{5379616} = 0.00000019$$

14

Illustrasjon av vinnersjansen i Lotto

Jernbanestrekningen fra Stavanger til Bodø er omtrent 1900 km

Tenk deg at det et sted på strekningen er plassert en basketkurv (diameter 45 cm)

Du reiser Stavanger – Bodø og slipper på et tilfeldig valgt sted en klinkekule ut av vinduet

Sannsynligheten for at du treffer kurven er

$$\frac{0.45}{1900 \cdot 1000} = 0.00000023$$

Det er omtrent det samme som sannsynligheten for å vinne førstepremie i Lotto

15

Oppgave 61 I Lotto kan du tippe system ved å krysse av mer enn sju tall på kupongen.

- Hvor mange rekker tipper du hvis du krysser av ni tall?
- Hvor mange rekker tipper du hvis du krysser av ti tall?

a) Antall rekker hvis du krysser av ni tall:


$${}_9C_7 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{9 \cdot 8}{1 \cdot 2} = 36$$

b) Antall rekker hvis du krysser av ti tall:

$${}_{10}C_7 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$$

16

c) På lottokupongen er det angitt hvor mange lottorekker du tipper hvis du krysser av 8, 9, 10, 11 eller 12 tall. Forklar hvordan Norsk Tipping har kommet fram til disse tallene.



Hvis vi krysser av n tall, tipper vi ${}_n C_7$ rekker (tallene blå ramme ovenfor gir ${}_n C_7$ for $n = 8, 9, 10, 11$ og 12)

Eksempel 6.10:

En pokerspiller får delt ut fem kort



Hva er sannsynligheten for at spilleren bare får hjerter?

Antall mulige måter å dele ut fem kort på:


$${}_{52} C_5 = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 2598960$$

Antall av disse som gir bare hjerter:

$${}_{13} C_5 = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 1287$$

$$P(\text{bare hjerter}) = \frac{1287}{2598960} = 0.0005$$


Pascals talltrekant



Talltrekanten kalles Pascals trekant, men den var kjent lenge før Pascal skrev om den


Kinesisk versjon fra 1300-tallet

(www.york.ac.uk/depts/mathshiststat)



Vi har at:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 1 \cdot a^2 + 2 \cdot ab + 1 \cdot b^2$$



$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = 1 \cdot a^3 + 3 \cdot a^2b + 3 \cdot ab^2 + 1 \cdot b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 = 1 \cdot a^4 + 4 \cdot a^3b + 6 \cdot a^2b^2 + 4 \cdot ab^3 + 1 \cdot b^4$$

Generelt finner vi koeffisientene i uttrykket for $(a+b)^n$ i n -te linje i Pascals trekant (når vi begynner nummereringen med linje 0)

Uttrykket $a+b$ kalles et *binom*

Formelen for å regne ut $(a+b)^n$ kalles

binomialformelen

Derfor kalles tallene i Pascals trekant for

binomialkoeffisienter

Vi skriver tall nummer r i linje nummer n i Pascals trekant som $\binom{n}{r}$

(nummereringen starter med linje og plass 0)

$$\begin{array}{cccc} & & \binom{0}{0} & \\ & & \binom{1}{0} & \binom{1}{1} \\ & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} \\ \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} \end{array}$$

21

Binomialkoeffisientene er generelt gitt ved

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

Formelen gjelder også for $r = 0$ og $r = n$ siden vi har $0! = 1$

Vi har uten videre at $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

Kan vise at $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}$

22

Hva er sammenhengen mellom binomialkoeffisientene de kombinatoriske tallene ${}_n C_r$?

$$\begin{aligned} {}_n C_r &= \frac{{}_n P_r}{r!} = \frac{{}_n P_r \cdot (n-r)!}{r! (n-r)!} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-r+1) \cdot (n-r) \cdot (n-r-1) \cdots 2 \cdot 1}{r! (n-r)!} \\ &= \frac{n!}{r! (n-r)!} = \binom{n}{r} \end{aligned}$$

Binomialkoeffisientene og de kombinatoriske tallene er de samme!

Vil bruke skrivemåten for binomialkoeffisientene

23

Flere eksempler

Eksempel 6.11: I en kartong er det 12 sikringer

Fire av dem er defekte, resten er i orden

Vi trekker tilfeldig tre sikringer

Hva er sannsynligheten for at én er defekt?

$$\text{Antall mulige utvalg } \binom{12}{3} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 220$$

$$\text{Antall gunstige utvalg } \binom{4}{1} \cdot \binom{8}{2} = 4 \cdot 28 = 112$$

$$P(\text{én defekt sikring}) = \frac{112}{220} = 0.509$$

24

Oppgave 67 Se på eksempel 6.11. Hva er sannsynligheten for at vi får a) ingen defekte sikringer; b) to defekte sikringer?

Antall mulige utvalg er $m = \binom{12}{3} = 220$

a) Her er antall gunstige utvalg $g = \binom{8}{3} = 56$

Derfor er:

$$P(\text{ingen defekte}) = \frac{g}{m} = \frac{56}{220} = 0.255$$

b) Her er antall gunstige utvalg $\binom{4}{2} \binom{8}{1} = 6 \cdot 8 = 48$

Det gir at

$$P(\text{to defekte}) = \frac{48}{220} = 0.218$$

25

Eksempel 6.12:

I en klasse er det 11 jenter og 14 gutter

Fire elever velges ved loddtrekning til en festkomité

Hva er sannsynligheten for at det blir to gutter og to jenter i komiteen?

Antall mulige utvalg: $\binom{25}{4} = 12650$

Antall gunstige utvalg: $\binom{14}{2} \cdot \binom{11}{2} = 91 \cdot 55 = 5005$

$$P(\text{to gutter og to jenter}) = \frac{5005}{12650} = 0.396$$

26

Eksempel 6.13:

En pokerspiller får delt ut fem tilfeldig valgte kort

Hva er sannsynligheten for at spilleren får to par?



Antall mulige utvalg: $\binom{52}{5} = 2598960$

Antall gunstige utvalg: $\underbrace{\binom{13}{2}}_{\text{valg av to verdier}} \cdot \underbrace{\binom{4}{2}}_{\text{valg av to kort i første verdi}} \cdot \underbrace{\binom{4}{2}}_{\text{valg av to kort i andre verdi}} \cdot \underbrace{\binom{44}{1}}_{\text{valg av ett kort i en tredje verdi}} = 123552$

$$P(\text{to par}) = \frac{123552}{2598960} = 0.048$$

27

Eksempel 6.14:

I en klasse er det 25 elever

Hva er sannsynligheten for at minst to har samme fødselsdag?

Vi regner først ut sannsynligheten for at ingen har samme fødselsdag

Antall mulige ordnede utvalg: 365^{25}

Antall gunstige ordnede utvalg: ${}_{365}P_{25}$

$$P(\text{ingen samme fødselsdag}) = \frac{{}_{365}P_{25}}{365^{25}} = 0.431$$

$$P(\text{minst to samme fødselsdag}) = 1 - \frac{{}_{365}P_{25}}{365^{25}} = 0.569$$

28