

MAT1030 – Diskret Matematikk

Forelesning 15: Rekursjon og induksjon

Roger Antonsen

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

11. mars 2009

(Sist oppdatert: 2009-03-10 20:38)



Repetisjon

Oppsummering

- Vi er nå ferdig med kapitell 6 og funksjoner.
- Det er noen grunnleggende begreper i tilknytning til kapitlet om funksjoner man må kjenne til for å kunne gå eksamensdagen i møte med ro i sinnet.
 - Hva en funksjon er.
 - Injektive funksjoner, også kalt 1-1-funksjoner eller enentydige funksjoner.
 - Surjektive funksjoner, også kalt på (onto).
 - Sammensetning av funksjoner.
 - Omvendte eller inverse funksjoner.

Oppsummering

Det er også viktig å holde orden på hva som menes med:

- *Definisjonsområdet* til en funksjon.
- *Verdiområdet* til en funksjon.
- *Bildemengden* til en funksjon.

I tillegg bør man kunne vite når

- man kan finne en invers til en funksjon.
- man kan sette sammen to funksjoner.

Kapittel 7

Innledning til rekursjon og induksjon

- Vi skal nå starte på avsnittet om **rekursive** konstruksjoner og bevis ved **induksjon**.
- Dette er det første stedet hvor årets MAT1030 vil omfatte mer stoff enn det læreboka omfatter.
- Det betyr at **forelesningene** er å betrakte som pensum, også der de går ut over rammene til læreboka.
- Alt stoff som er eksamensrelevant vil man finne i læreboka eller i forelesningsnotatene som legges ut på nettet.

Innledning til rekursjon og induksjon

- Læreboka behandler for det meste rekursjon og induksjon over de naturlige tallene \mathbb{N} .
- I en informatikk-sammenheng fins det andre **induktivt konstruerte** mengder hvor tilsvarende metoder har mening.
- Vi skal etterhvert se på noen generelle og spesielle eksempler av interesse for informatikk.
- Vi skal imidlertid først se på rekursjon i en begrenset, men viktig, forstand.

Eksempel

- Vi definerer en funksjon $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ved
 1. $f(1) = 2$
 2. $f(n + 1) = 2^{f(n)}$ for alle n .
- Vi har ikke definert f ved en formel, så er f veldefinert?

Eksempel (Fortsatt)

- En test kan jo være om vi er i stand til å skrive et program for f .
- Vi kan oppfatte punktene 1. og 2. på forrige side som en [spesifikasjon](#).
- Vi har tidligere sett hvordan vi kan finne en pseudokode for $g(z) = 2^z$
- Det betyr at vi kan bruke en instruksjon på formen

$$z \leftarrow 2^y$$

med vissheten om at vi kan erstatte den ene linjen med en pseudokode.

- Da er det lett å lage en pseudokode for f .

Rekursjon

Eksempel (Fortsatt)

1. *Input* x [$x \in \mathbb{N}$]
2. $z \leftarrow 2$
3. $i \leftarrow 1$
4. **While** $i < x$ **do**
 - 4.1 $i \leftarrow i + 1$
 - 4.2 $z \leftarrow 2^z$
5. *Output* z

Vi kaller $f(x)$ verdien på 2^{er} -tårnet av høyde x .

Eksempel

- Vårt neste eksempel er en funksjon som brukes mye i matematikk og i sannsynlighetsregning,

$$n \mapsto n!,$$

eller **fakultetsfunksjonen**.

- Vi kan bruke omtrent samme formatet som i forrige eksempel.
 1. $1! = 1$
 2. $(n + 1)! = n! \cdot (n + 1)$ for alle $n \in \mathbb{N}$.
- Vi kan nærmest kopiere pseudokoden fra forrige eksempel, og får følgende algoritme for beregning av $n!$.

Eksempel (Fortsatt)

1. *Input* x [$x \in \mathbb{N}$]
2. $z \leftarrow 1$
3. $i \leftarrow 1$
4. **While** $i < x$ **do**
 - 4.1 $i \leftarrow i + 1$
 - 4.2 $z \leftarrow z \cdot (i)$
5. *Output* z

Rekursjon

- Læreboka tar utgangspunkt i tallfølger, mens vi tar utgangspunkt i funksjoner.
- Det er i prinsippet ingen forskjell mellom en uendelig tallfølge og en funksjon definert på \mathbb{N}
- Tallfølgen

$$1, 2, 6, 24, 120, 720, \dots$$

er bare en annen måte å skrive fakultetsfunksjonen på.

- Hvorvidt man i konkrete tilfeller bruker tallfølger eller funksjoner, avhenger av hva som er pedagogisk mest forstandig for anledningen.

Rekursjon

- Kan vi gi en bedre begrunnelse for at de to funksjonene vi har sett på er veldefinerte enn at vi kan finne pseudokoder for dem?
- Svaret er selvfølgelig *JA*.
- Vi kan nå alle naturlige tall ved å
 1. Starte med 1
 2. Legge til 1 så mange ganger som nødvendig.
- Hvis vi da definerer en funksjon f ved å bestemme
 1. hva $f(1)$ er
 2. hvordan $f(n + 1)$ avhenger av $f(n)$ og nhar vi bestemt $f(n)$ for alle n .
- Vi kan oppfatte en konkretisering av punktene 1 og 2 over som en *spesifikasjon*.
- Vi skal se på et eksempel i detalj.

Eksempel

Vi definerer funksjonen $f(n, m)$ ved rekursjon på n ved

1. $f(1, m) = 2m - 1$

2. $f(n + 1, m) = 2f(n, m) - 1$

- Med tilstrekkelig tålmodighet kan vi finne et uttrykk for $f(n, m)$ for hver enkelt n ved følgende.

Rekursjon

Eksempel

1. $f(1, m) = 2m - 1$
2. $f(2, m) = 2f(1, m) - 1 = 2(2m - 1) - 1 = 4m - 3$
3. $f(3, m) = 2f(2, m) - 1 = 2(4m - 3) - 1 = 8m - 7$
4. $f(4, m) = 2f(3, m) - 1 = 2(8m - 7) - 1 = 16m - 15$
- ...

Vi ser at vi kan gjøre listen av utregninger så lang vi vil, så $f(n, m)$ er definert for alle n og m .

En annen sak er om vi kan vise den formelen som ser ut til å peke seg ut.

Da vil vi få bruk for [induksjonsbevis](#).

Rekursjon

- Læreboka har brukt **For**-løkker der vi har brukt **While**-løkker.
- Forskjellen er kosmetisk.
- Det viktige er at vi bruker en løkke til å fange opp formatet
 1. $g(1) = a$
 2. $g(n + 1) = f(g(n), n)$
- og at vi har en standard overgang fra en pseudokode for f til en pseudokode for g .
- Vi sier at g er definert fra a og f ved [rekursjon](#).
- Vi beskriver den generelle **For**-løkka på neste side.

Rekursjon

1. *Input* n [$n \in \mathbb{N}$]
2. $x \leftarrow a$
3. **For** $m = 2$ **to** n **do**
 - 3.1 $x \leftarrow f(x, m)$
4. *Output* x

Merk

Vi sier at klassen av funksjoner programmerbare via en pseudokode er **lukket** under *definisjoner ved rekursjon*.

Oppgave

Betrakt følgende pseudokode, hvor det inngår en rekursiv definisjon.

1. *Input* n [$n \in \mathbb{N}$]
2. $x \leftarrow 1$
3. $y \leftarrow 1$
4. $z \leftarrow 1$
5. **For** $m = 2$ **to** n **do**
 - 5.1 $y \leftarrow y + 1$
 - 5.2 **For** $k = 1$ **to** y **do**
 - 5.2.1 $z \leftarrow z + 1$
 - 5.2.2 $x \leftarrow x + z$
6. *Output* x

Oppgave (Fortsatt)

- Følg beregningen og finn verdien på output for $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ og $n = 4$.
- Hvordan tror du denne følgen fortsetter?
- Vil beregningen stoppe uansett hvilket naturlig tall n vi starter med?

Rekursjon

- Til nå har vi bare sett på funksjoner fra \mathbb{N}_0 til \mathbb{N}_0 definert ved rekursjon.
- Filosofien bak hvorfor rekursive definisjoner gir mening gir oss også muligheten til å betrakte andre definisjonsområder.

Eksempel

La $f(2) = 1$

Hvis $n \geq 2$ definerer vi $f(n + 1)$ ved

- $f(n + 1) = f(n)$ hvis n ikke er et primtall.
- $f(n + 1) = f(n) + 1$ hvis n er et primtall.

Da er $f(n)$ definert for alle tall $n \geq 2$ og forteller oss hvor mange primtall det fins $\leq n$.

Rekursjon

- Foreløpig gir det ikke mening å bruke rekursjon til å definere funksjoner med definisjonsområder som ikke er \mathbb{N} , \mathbb{N}_0 eller $\{n \in \mathbb{N} : n \geq k\}$ for en k .
- Det er imidlertid ingen grunn til at verdiområdet skal bestå av tall, noe vårt neste eksempel vil vise.

Eksempel

- Vi har en klassisk definisjon av **regningsart** R_n nummer n :
- $R_1(x, y) = x + y$
- R_2 defineres rekursivt ved
 - $R_2(0, y) = 0$
 - $R_2(x + 1, y) = R_1(R_2(x, y), y)$
- Hvis $n \geq 2$ og R_n er definert, definerer vi R_{n+1} rekursivt ved
 - $R_{n+1}(0, y) = 1$
 - $R_{n+1}(x + 1, y) = R_n(R_{n+1}(x, y), y)$.

Vi ser at R_1 er addisjon, R_2 er multiplikasjon, R_3 er eksponensiering osv.

Eksempel

- La oss gå tilbake til den rekursive definisjonen

1. $f(1, m) = 2m - 1$

2. $f(n + 1, m) = 2f(n, m) - 1$

hvor det er naturlig å gjette på at

$$f(n, m) = 2^n \cdot m - (2^n - 1).$$

- Vi har sett at denne formelen stemmer for $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ og $n = 4$ da vi regnet ut

Eksempel (Fortsatt)

1. $f(1, m) = 2m - 1$
 2. $f(2, m) = 2f(1, m) - 1 = 2(2m - 1) - 1 = 4m - 3$
 3. $f(3, m) = 2f(2, m) - 1 = 2(4m - 3) - 1 = 8m - 7$
 4. $f(4, m) = 2f(3, m) - 1 = 2(8m - 7) - 1 = 16m - 15$
- Hvis vi nå forsøker å se om formelen stemmer for $n = 5$ på en slik måte at vi forhåpentligvis finner en forklaring, kan vi regne som følger:

Eksempel (Fortsatt)

$$f(5, m) = 2f(4, m) - 1 = 2(2^4 m - (2^4 - 1)) - 1 =$$

$$2 \cdot 2^4 m - 2(2^4 - 1) - 1 =$$

$$= 2^5 m - 2^5 + 2 - 1 = 2^5 m - (2^5 - 1).$$

Induksjonsbevis

Eksempel (Fortsatt)

- I denne utregningen har vi bare brukt at $5 = 4 + 1$
- Vi kunne erstattet 4 med en vilkårlig n og 5 med $n + 1$, og fått utregningen

$$\begin{aligned}f(n + 1, m) &= 2f(n, m) - 1 = 2(2^n m - (2^n - 1)) - 1 = \\&= 2 \cdot 2^n m - 2(2^n - 1) - 1 = \\&= 2^{n+1} m - 2^{n+1} + 2 - 1 = 2^{n+1} m - (2^{n+1} - 1).\end{aligned}$$

- Dermed har vi gitt det som kalles et **induksjonsbevis** for at formelen vår er riktig.

Induksjonsbevis

- Hvorfor kan vi betrakte argumentet over som et bevis for at formelen holder for alle n ?
- Årsaken er at vi nå vet at vi ved direkte utregning kan bevise formelen hver gang noen gir oss en verdi for n , for eksempel $n = 8$.
- Vi vet nå at formelen holder for $n = 5$ og vi vet at siden den holder for $n = 5$ må den holde for $n = 6$.
- Utregningen vår gir imidlertid at formelen også må holde for $n = 7$ og deretter for $n = 8$.
- Siden vi vet at vi med utholdenhet kan fortsette å tenke slik så langt noen kunne ønske, vet vi at formelen vår må holde for alle n .

Induksjonsbevis

- Den metoden vi har brukt til å bevise en påstand for alle naturlige tall på kalles som sagt **induksjonsbevis**.
- I sin enkleste form kan induksjonsbevis formuleres som:

Definisjon

La $P(n)$ være et predikat med en variabel n for et element i \mathbb{N} .

Anta at vi kan bevise

1. $P(1)$
2. $\forall n(P(n) \rightarrow P(n + 1))$

Da kan vi konkludere $\forall nP(n)$.

Denne måten å bevise $\forall nP(n)$ på kalles **induksjon**.