

# MAT1030 – Plenumsregning 9

## Ukeoppgaver

Mathias Barra - 13. mars 2009

(Sist oppdatert: 2009-03-17 09:35)

### Oppgave 5.18

Avgjør om følgende relasjoner refleksive, irrefleksive, symmetriske, antisymmetriske eller transitive.

- “er søsken (bror eller søster) til”, på mengden av alle mennesker
- “er sønnen til”, på mengden av alle mennesker
- “er større enn”, på mengden av reelle tall
- relasjonen  $R$  på reelle tall definert ved  $xRy$  hvis  $x^2 = y^2$
- “har samme heltallsdel som”, på mengden av reelle tall
- “er et multiplum av”, på mengden av positive heltall

### Oppgave 5.19

Avgjør hvilke av relasjonene i Oppgave 5.18 som er *ekvivalensrelasjoner (ekv.rel.)*. For de som er ekvivalensrelasjoner, beskriv ekvivalensklassene.

Husk at en ekv.rel. er *refleksiv, symmetrisk og transitiv*.

### Oppgave 5.20

Avgjør hvilke av relasjonene i Oppgave 5.18 som er *partielle ordninger (p.o.)*.

Husk at en p.o. er *refleksiv, antisymmetrisk og transitiv*.

### Løsning

- “er søsken (bror eller søster) til”, på mengden av alle mennesker
  - Refleksiv? **Nei**, det fins en som ikke er sin egen bror eller søster.
  - Irrefleksiv? **Ja**, ingen er sin egen bror eller søster.
  - Symmetrisk? **Ja**, hvis  $x$  er søsken til  $y$ , så er  $y$  søsken til  $x$ .
  - Antisymmetrisk? **Nei**, vi ha at  $x$  er søsken til  $y$  og at  $y$  søsken til  $x$ , uten at  $x = y$ .

- Transitiv? **Nei**, hvis vi tillater halvsøsken, så kan a være søsken til b, og b søsken til c, uten at a er søsken til c. En annen grunn er at a kan være søsken til b og b søsken til a, men a kan ikke være søsken til a. (Takk til oppmerksomme studenter!)
- Ekvivalensrelasjon? **Nei**, den er ikke refleksiv
- Partiell ordning? **Nei**, den er hverken refleksiv, antisymmetrisk eller transitiv.

### Løsning

(b) “er sønnen til”, på mengden av alle mennesker

- Refleksiv? **Nei**, det fins en som ikke er sin egen sønn.
- Irrefleksiv? **Ja**, ingen er sin egen sønn.
- Symmetrisk? **Nei**, fordi “X er sønnen til Y” ikke medfører at “Y er sønnen til X”.
- Antisymmetrisk? **Ja**, fordi “X er sønnen til Y” og “Y er sønnen til X” aldri er sanne samtidig.
- Transitiv? **Nei**, “X er sønnen til Y” og “Y er sønnen til Z” ikke medfører at “X er sønnen til Z”.
- Ekvivalensrelasjon? **Nei**, den er hverken refleksiv, symmetrisk eller transitiv.
- Partiell ordning? **Nei**, den er hverken refleksiv eller transitiv.

### Løsning

(c) “er større enn”, på mengden av reelle tall

- Refleksiv? **Nei**, det finnes et reellt tall som ikke er større enn seg selv.
- Irrefleksiv? **Ja**, ingen reelle tall er større enn seg selv.
- Symmetrisk? **Nei**, f.eks. er 3 større enn 2, men 2 er ikke større enn 3.
- Antisymmetrisk? **Ja**, vi kan ikke ha at to tall er større enn hverandre.
- Transitiv? **Ja**, hvis x er større enn y og y er større enn z, så er x større enn z.
- Ekvivalensrelasjon? **Nei**, den er hverken refleksiv eller symmetrisk.
- Partiell ordning? **Nei**, den er ikke refleksiv.

### Løsning

(d) relasjonen R på reelle tall definert ved  $xRy$  hvis  $x^2 = y^2$


- Refleksiv? **Ja**, siden  $x^2 = x^2$ .
- Irrefleksiv? **Nei**, nei, f.eks. har vi at  $1R1$ .

- Symmetrisk? **Ja**, hvis  $x^2 = y^2$  holder, så vil også  $y^2 = x^2$  holde.
- Antisymmetrisk? **Nei**, vi har at  $1R(-1)$  og  $(-1)R1$ , men  $1 \neq -1$ .
- Transitiv? **Ja**, hvis  $x^2 = y^2$  og  $y^2 = z^2$ , så  $x^2 = z^2$ .
- Ekvivalensrelasjon? **Ja**
- Ekvivalensklasser: Alle mengder  $\{x, -x\}$ , hvor  $x$  er et positivt reelt tall, samt  $\{0\}$ .
- Partiell ordning? **Nei**, den er ikke antisymmetrisk.

### Løsning

(e) “har samme heltallsdel som”, på mengden av reelle tall

- Refleksiv? **Ja**, ethvert tall har samme heltallsdel som seg selv.
- Irrefleksiv? **Nei**, f.eks. har 3, 14 samme heltallsdel som seg selv.
- Symmetrisk? **Ja**, hvis  $x$  har samme heltallsdel som  $y$ , så må  $y$  ha samme heltallsdel som  $x$ .
- Antisymmetrisk? **Nei**, vi har at 1, 28 og 1, 32 har samme heltallsdel, men de er ikke like.
- Transitiv? **Ja**
- Ekvivalensrelasjon? **Ja**
- Ekvivalensklasser: For hvert heltall  $n$  har vi en ekvivalensklasse som består av de reelle tall med heltallsdel lik  $n$ :



Ekvivalensklassene er følgende mengder, for  $n \in \mathbb{N}$ :  $\{x : -n - 1 < x \leq -n\}$  og  $\{x : -1 < x < 1\}$  og  $\{x : n \leq x < n + 1\}$   
 (Fasiten i boka sier  $\{x : -n < x \leq -n + 1\}$ , men det blir feil for  $n = 1$ .)

- Partiell ordning? **Nei**, den er ikke antisymmetrisk.

### Løsning

(f) “er et multiplum av”, på mengden av positive heltall

- Refleksiv? **Ja**, ethvert tall er et multiplum av seg selv.
- Irrefleksiv? **Nei**, f.eks. er 2 et multiplum av seg selv.
- Symmetrisk? **Nei**, 4 er et multiplum av 2, og 2 er ikke et multiplum av 4.
- Antisymmetrisk? **Ja**
  - Anta at  $x = ay$  og at  $y = bx$ , for positive heltall  $x, y, a, b$ .
  - Da må  $x = abx$ .

- Siden alle tallene er positive heltall, må  $ab = 1$ , og dermed må  $a = 1$  og  $b = 1$ .
- Siden  $x = ay$ , må  $x = y$ .
- Transitiv? **Ja**
  - Anta at  $x = ay$  og at  $y = bz$ , for positive heltall  $x, y, z, a, b$ .
  - Da må  $x = abz$ , og  $x$  er et multiplum av  $z$ .
- Ekvivalensrelasjon? **Nei**, den er ikke symmetrisk.
- Partiell ordning? **Ja**

### Oppgave 5.21

Et dataprogram består av fem moduler:  $M_1, M_2, \dots, M_5$ . En relasjon  $R$  på mengden av moduler er definert ved at  $M_i R M_j$  hvis  $M_i$  er i kallesekvensen til  $M_j$ . Relasjonsmatrisen til  $R$  er denne:

$$\begin{array}{c}
 \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{T} \end{bmatrix}
 \end{array}$$

- (a) Bekreft at  $R$  er refleksiv, antisymmetrisk og transitiv.
- (b) Hvilken modul er hovedprogrammet?

### Løsning

$$\begin{array}{c}
 \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{F} \\
 \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{T} \end{bmatrix}
 \end{array}$$

- $R$  er refleksiv: Alle verdier på diagonalen er **T**.
- $R$  er antisymmetrisk: Fordi ingen **T** speiles om diagonalen.
- $R$  er transitiv: Vi må sjekke alle muligheter i matrisen.
- Hvilken modul er hovedprogrammet? Oppgaven sa at  $M_i R M_j$  holder hvis  $M_i$  er i kallesekvensen til  $M_j$ .  $M_3$  skiller seg ut. Den kaller på alle moduler og blir kun kalt på av seg selv. Dette må være hovedprogrammet.

### Oppgave Fra forelesning 03.03 s. 15

La  $A$  være en mengde med ekvivalensrelasjoner  $R$  og  $S$ . Definer  $T = R \cap S$ .

- (a) Vis at  $aTb$  hvis og bare hvis  $aRb \wedge aSb$ .
- (b) Vis at  $T$  er en ekvivalensrelasjon.
- (c) Finn et eksempel hvor  $R \cup S$  ikke er en ekv.rel.

#### Løsning (a)

$aTb$  betyr  $aTb \Leftrightarrow (a, b) \in T$  betyr  $aTb \Leftrightarrow (a, b) \in R \cap S$  betyr  $aTb \Leftrightarrow (a, b) \in R$  og  $(a, b) \in S$  betyr  $aTb \Leftrightarrow aRb$  og  $aSb$  betyr  $aTb \Leftrightarrow aRb \wedge aSb \Leftrightarrow aTb$  Med 'betyr at' menes her 'er definert som'. Altså: Siden  $\Leftrightarrow$  er transitiv er vi ferdige.

#### Løsning (b)

**Refleksiv** La  $a \in A$  være vilkårlig (Vi må vise  $aTa$ ). Siden  $R$  og  $S$  er refleksive, vil  $aRa$  og  $aSa$ . Dermed er  $(a, a) \in R \cap S$ , dvs.  $aTa$ . Siden  $a$  var vilkårlig er altså  $T$  refleksiv.

**Symmetrisk** Anta  $aTb$  (Vi må vise at  $bTa$ ). Da vil  $aRb$  og  $aSb$  fordi  $T = R \cap S$ . Siden  $R$  er symmetrisk vil  $bRa$ , og siden  $S$  er symmetrisk vil også  $bSa$ . Men da er  $bTa$ , altså er  $T$  symmetrisk.

**Transitiv** Anta  $aTb$  og  $bTc$  (Vi må vise at  $aTc$ ). Ved  $T = R \cap S$  vet vi at  $aRb$  og  $bRc$ . Siden  $R$  er transitiv, vil  $aRc$ . Det samme argumentet vil og gi  $aSc$ , da  $S$  også er transitiv. Altså vil  $aTc$ , som var det vi skulle vise.

#### Løsning (c)

Vi kan ikke håpe på at  $R \cup S$  ikke skal være refleksiv (*Hvorfor ikke?*), og heller ikke at  $R \cup S$  ikke skal være symmetrisk (*Hvorfor ikke?*). Transitiviteten derimot. . .

La  $A = \{a, b, c\}$  og la  $R_1 = \{(a, b), (b, a), (a, a), (b, b), (c, c)\}$  og  $R_2 = \{(a, c), (c, a), (a, a), (b, b), (c, c)\}$ . Begge er ekvivalensrelasjoner. Men, i  $R = R_1 \cup R_2$  finnes både  $(b, a)$  og  $(a, c)$ , men ikke  $(b, c)$ , så  $R$  er ikke transitiv, og altså ingen ekv.rel.

(Vi kan si at symmetri og refleksivitet er lokale egenskaper, mens transitivitet er en global egenskap.)

### Oppgave Fra forelesningen 03.03 s. 22–23 (for spesielt interesserte)

La  $R$  være en relasjon på en mengde  $A$ .

Vi kaller  $R$  en preordning hvis  $R$  er transitiv og refleksiv.

Definer relasjonen  $S$  på  $A$  ved  $aSb$  når  $aRb \wedge bRa$ .

(a) Vis at  $S$  er en ekvivalensrelasjon på  $A$ .

Der er vanlig å skrive  $A/S$  for mengden av ekvivalensklasser  $E(a)$  til ekvivalensrelasjonen  $S$ .

### Løsning (a)

- $S$  er refleksiv:
  - La  $a$  være et vilkårlig element fra  $A$ .
  - Siden  $R$  er refleksiv, må  $aRa$ .
  - Da holder  $aRa \wedge aRa$ .
  - Da holder  $aSa$ .
- $S$  er symmetrisk:
  - Anta at  $aSb$ , for vilkårlige elementer  $a$  og  $b$  fra  $A$ .
  - Da holder  $aRb \wedge bRa$  per definisjon av  $S$ .
  - Da må  $bSa$  holde.
- $S$  er transitiv:
  - Anta  $aSb$  og  $bSc$ , for vilkårlige elementer  $a$ ,  $b$  og  $c$  fra  $A$ .
  - Per definisjon av  $S$  har vi  $aRb \wedge bRa$  og  $bRc \wedge cRb$ .
  - Siden  $aRb$  og  $bRc$ , og  $R$  er transitiv, vil  $aRc$ .
  - Siden  $cRb$  og  $bRa$ , og  $R$  er transitiv, vil  $cRa$ .
  - Da holder  $aRc \wedge cRa$ , og dermed  $aSc$ .

### Oppgave Fra forelesningen 03.03 s. 22–23 (for spesielt interesserte)

Vi definerer en relasjon  $\hat{R}$  på  $A/S$  ved

$$E(a)\hat{R}E(b)$$

om  $aRb$

- (b) Vis at det ikke spiller noen rolle hvilke elementer i ekvivalensklassene  $E(a)$  og  $E(b)$  vi bruker.
- (c) Vis at  $\hat{R}$  er en partiell ordning på mengden av ekvivalensklasser.

### Løsning (b)

- Anta at  $aRb$ , og at  $a' \in E(a)$  og  $b' \in E(b)$ .
- Det er tilstrekkelig å vise at  $a'Rb'$ , for det betyr at det ikke spiller noen rolle hvilke elementer i ekvivalensklassene vi bruker når vi definerer  $\hat{R}$ .
- Siden  $a$  og  $a'$  er i samme ekvivalensklasse, må  $aSa'$ , det vil si  $aRa'$  og  $a'Ra$ .
- Siden  $b$  og  $b'$  er i samme ekvivalensklasse, må  $bSb'$ , det vil si  $bRb'$  og  $b'Rb$ .
- $a'Ra$  og  $aRb$  gir at  $a'Rb$ , siden  $R$  er transitiv.
- $a'Rb$  og  $bRb'$  gir at  $a'Rb'$ , siden  $R$  er transitiv.
- Tegn figur!

### Løsning (c)

- $\hat{R}$  er refleksiv, siden  $E(a)\hat{R}E(a)$  holder for alle  $E(a)$ .
- $\hat{R}$  er transitiv:
  - Anta at  $E(a)\hat{R}E(b)$  og  $E(b)\hat{R}E(c)$ .
  - Da må  $aRb$  og  $bRc$ .
  - Siden  $R$  er transitiv, må  $aRc$ .
  - Da må  $E(a)\hat{R}E(c)$ .
- $\hat{R}$  er antisymmetrisk.
  - Anta at  $E(a)\hat{R}E(b)$  og  $E(b)\hat{R}E(a)$ .
  - Da må  $aRb$  og  $bRa$ .
  - Da må  $aSb$ .
  - Da må  $E(a)$  og  $E(b)$  være samme ekvivalensklasse.

### Oppgave 6.1

Avgjør hvorvidt følgende funksjoner er veldefinerte. For de som er veldefinerte, gi definisjonsområdet, verdiområdet og bildemengden.

[Se læreboken på side 107.]

## Løsning

Vi setter opp en tabell.

	Veldefinert?	Definisjonsområde	Verdiområde	Bildemengde
(a)	Ja	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
(b)	Nei, $g(1)$ er ikke i $\mathbb{J}$ .			
(c)	Nei, $h(3) = 4$ er ikke i $\{1, 2, 3\}$ .			
(d)	Ja	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
(e)	Ja	$\mathbb{R} - \{0\}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} - \{0\}$
(f)	Nei, $ispositive(0)$ er ikke definert.			
(g)	Ja	$\mathbb{N}$	$\mathbb{J}$	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
(h)	Nei, $\psi(a)$ er den tomme strengen og er ikke med i $S$ .			