

# MAT1030 – Diskret Matematikk

## Forelesning 22: Grafteori

Dag Normann

Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

14. april 2010

(Sist oppdatert: 2010-04-14 12:40)



# Kombinatorikk

# Oppsummering av regneprinsipper

# Oppsummering av regneprinsipper

- Ordnet utvalg med repetisjon:  $n^r$

# Oppsummering av regneprinsipper

- Ordnet utvalg med repetisjon:  $n^r$
- Ordnet utvalg uten repetisjon:  ${}^n P_r$

# Oppsummering av regneprinsipper

- Ordnet utvalg med repetisjon:  $n^r$
- Ordnet utvalg uten repetisjon:  ${}^n P_r$
- Permutasjoner:  $n!$

# Oppsummering av regneprinsipper

- Ordnet utvalg med repetisjon:  $n^r$
- Ordnet utvalg uten repetisjon:  ${}^n P_r$
- Permutasjoner:  $n!$
- Kombinasjoner:  $\binom{n}{k}$


# Oppsummering av regneprinsipper

- Ordnet utvalg med repetisjon:  $n^r$
- Ordnet utvalg uten repetisjon:  ${}^n P_r$
- Permutasjoner:  $n!$
- Kombinasjoner:  $\binom{n}{k}$
- Vi skal se på noen flere eksempler.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.






## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.




- Hvor mange slike stier er det?



## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$  og åtte av tegnene er  $\rightarrow$ .

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$  og åtte av tegnene er  $\rightarrow$ .
- Hvor mange slike ord er det?

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$  og åtte av tegnene er  $\rightarrow$ .
- Hvor mange slike ord er det? Det er  $\binom{12}{4}$

## Eksempel


På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$  og åtte av tegnene er  $\rightarrow$ .
- Hvor mange slike ord er det? Det er  $\binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$

## Eksempel

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i dette 8 ganger 4-rutenettet? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover eller til høyre.



- Hvor mange slike stier er det?
- Denne stien kan representeres som  $\uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \uparrow$ .
- Dette er et ord på 12 tegn over alfabetet  $\{\uparrow, \rightarrow\}$  hvor fire av tegnene er  $\uparrow$  og åtte av tegnene er  $\rightarrow$ .
- Hvor mange slike ord er det? Det er  $\binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 495$



# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:


# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:



# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




- Antall ord blir i dette tilfellet:



# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




- Antall ord blir i dette tilfellet:

$$\binom{4}{2}$$

# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




- Antall ord blir i dette tilfellet:

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1}$$

# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




- Antall ord blir i dette tilfellet:

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

# Eksempel

- Vi sjekker at det stemmer for 2 ganger 2-rutenettet:




- Antall ord blir i dette tilfellet:

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

som stemmer...


## Oppgave

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i denne  $2 \times 2 \times 2$ -kuben? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover, til høyre eller innover?



## Oppgave

På hvor mange forskjellige måter kan vi gå fra A til B i denne  $2 \times 2 \times 2$ -kuben? Vi må gå ett steg av gangen og kun oppover, til høyre eller innover?



# Eksempel

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)



# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?
- Vi ikke er interessert i hvilken karakter en bestemt student får, men kun antallet av hver karakter i fordelingen.

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?
- Vi ikke er interessert i hvilken karakter en bestemt student får, men kun antallet av hver karakter i fordelingen.
- Det er 6 muligheter for hver av de 10 studentene.

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?
- Vi ikke er interessert i hvilken karakter en bestemt student får, men kun antallet av hver karakter i fordelingen.
- Det er 6 muligheter for hver av de 10 studentene.
- Kan vi bruke multiplikasjonsprinsippet og si at svaret er  $6^{10}$ ?

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?
- Vi ikke er interessert i hvilken karakter en bestemt student får, men kun antallet av hver karakter i fordelingen.
- Det er 6 muligheter for hver av de 10 studentene.
- Kan vi bruke multiplikasjonsprinsippet og si at svaret er  $6^{10}$ ? **Nei**

# Eksempel

- (Dette ble også nevnt på forrige forelesning i et introduksjonseksempel om kuler og bokser.)
- På hvor mange ulike måter kan de 6 karakterene A til F gis til 10 studenter?
- Vi ikke er interessert i hvilken karakter en bestemt student får, men kun antallet av hver karakter i fordelingen.
- Det er 6 muligheter for hver av de 10 studentene.
- Kan vi bruke multiplikasjonsprinsippet og si at svaret er  $6^{10}$ ? **Nei**
- La oss lage 6 båser og putte studentene i hver sin bås avhengig av hvilken karakter de får.

# Eksempel

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?
- Av 15 tegn må 5 være røde streker.

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?
- Av 15 tegn må 5 være røde streker.
- Antall muligheter må være



## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?
- Av 15 tegn må 5 være røde streker.
- Antall muligheter må være

$$\binom{15}{5}$$

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?
- Av 15 tegn må 5 være røde streker.
- Antall muligheter må være

$$\binom{15}{5} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

## Eksempel

- 2 studenter per karakter, og ingen stryk kan representeres slik:



- Fordelingen 123211 kan representeres slik:



- At alle stryker kan representeres slik:



- Hvor mange slike kombinasjoner fins det?
- Av 15 tegn må 5 være røde streker.
- Antall muligheter må være

$$\binom{15}{5} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 3003$$

# Eksempel

# Eksempel

## Eksempel

- Mer generelt har vi

# Eksempel

## Eksempel

- Mer generelt har vi

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

# Eksempel

## Eksempel

- Mer generelt har vi

$$\binom{n + k - 1}{k - 1}$$

som gir hvor mange forskjellige måter vi kan fordele  $n$  identiske elementer i  $k$  forskjellige beholdere på.

# Eksempel

## Eksempel

- Mer generelt har vi

$$\binom{n + k - 1}{k - 1}$$

som gir hvor mange forskjellige måter vi kan fordele  $n$  identiske elementer i  $k$  forskjellige beholdere på.

- Dette kalles også for uordnet utvalg *med repetisjon*.



# Grafteori

# Grafteori

# Grafteori


- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.

# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:


# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:




# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:




# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:



# Grafteori


- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:






# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:




# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:




# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:




# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:



# Grafteori

- I går ga vi en smaksprøve på *grafteori*.
- Vi sa at en *graf* består av *noder* og *kanter*:



- Vi ga følgende oppgave: Klarer dere å tegne denne på et ark uten å løfte blyanten og uten å gå over en kant to ganger?

# Grafteori

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.



# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.
- Vi har møtt idéen om *representasjon* flere ganger allerede.

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.
- Vi har møtt idéen om *representasjon* flere ganger allerede.
- Vi representerer f.eks. reelle tall ved hjelp av binære tall.

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.
- Vi har møtt idéen om *representasjon* flere ganger allerede.
- Vi representerer f.eks. reelle tall ved hjelp av binære tall.
- Vi kan representere et matematisk problem som et annet som er enklere å løse.

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.
- Vi har møtt idéen om *representasjon* flere ganger allerede.
- Vi representerer f.eks. reelle tall ved hjelp av binære tall.
- Vi kan representere et matematisk problem som et annet som er enklere å løse.
- En representasjon gjør at vi kan se bort fra det som er irrelevant. Vi fanger inn *essensen*.

# Grafteori

- Grafer fins overalt rundt oss!
- Grafteori er en viktig del av både *anvendt* og *teoretisk* matematikk.
- Grafteori brukes til å modellere problemer innenfor mange områder: informatikk, biologi, samfunnsvitenskap, lingvistikk, fysikk ...
- Mange problemer kan *representeres* ved å bruke grafer.
- Vi har møtt idéen om *representasjon* flere ganger allerede.
- Vi representerer f.eks. reelle tall ved hjelp av binære tall.
- Vi kan representere et matematisk problem som et annet som er enklere å løse.
- En representasjon gjør at vi kan se bort fra det som er irrelevant. Vi fanger inn *essensen*.
- Det er akkurat det som skjer i grafteori.

# En graf



# En graf

- En *graf* består av *noder*

# En graf

- En *graf* består av *noder* (●)



# En graf

- En *graf* består av *noder* (●) og *kanter*

# En graf


- En *graf* består av *noder* () og *kanter* ()

# En graf

- En *graf* består av *noder* () og *kanter* ().
- Vi har til nå sett et eksempel på en graf:


# En graf

- En *graf* består av *noder* (●) og *kanter* (—).
- Vi har til nå sett et eksempel på en graf:



# En graf


- En *graf* består av *noder* (●) og *kanter* (—).
- Vi har til nå sett et eksempel på en graf:



- Klarte dere å tegne denne på et ark uten å løfte blyanten og uten å gå over en kant to ganger?

# En graf

- En *graf* består av *noder* (●) og *kanter* (—).
- Vi har til nå sett et eksempel på en graf:




- Klarte dere å tegne denne på et ark uten å løfte blyanten og uten å gå over en kant to ganger?
- Etter disse forelesningene i grafteori skal alle klare å besvare dette spørsmålet umiddelbart.



# En graf

- En graf består av *noder* (●) og *kanter* (—).
- Vi har til nå sett et eksempel på en graf:



- Klarte dere å tegne denne på et ark uten å løfte blyanten og uten å gå over en kant to ganger?
- Etter disse forelesningene i grafteori skal alle klare å besvare dette spørsmålet umiddelbart.
- Vi skal se at oppgaven er ekvivalent med å finne en såkalt *Eulersti*.

# Søkealgoritmer for grafer

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:
  - *Prims algoritme* for å finne et *minimalt spennetre* i en vektet graf.

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:
  - *Prims algoritme* for å finne et *minimalt spennetre* i en vektet graf.  
(Kruskals algoritme for samme problem.)

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:
  - *Prims algoritme* for å finne et *minimalt spennetre* i en vektet graf. (Kruskals algoritme for samme problem.)
  - *Dijkstras algoritme* for å finne *minste avstand*, eller *korteste sti*, i en vektet graf.

# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:
  - *Prims algoritme* for å finne et *minimalt spennetre* i en vektet graf. (Kruskals algoritme for samme problem.)
  - *Dijkstras algoritme* for å finne *minste avstand*, eller *korteste sti*, i en vektet graf.
- Vi kan søke bredde først eller dybde først



# Søkealgoritmer for grafer

- Søkealgoritmer for grafer er et viktig tema.
- Kjente søkealgoritmer for grafer er f.eks.:
  - *Prims algoritme* for å finne et *minimalt spennetre* i en vektet graf. (Kruskals algoritme for samme problem.)
  - *Dijkstras algoritme* for å finne *minste avstand*, eller *korteste sti*, i en vektet graf.
- Vi kan søke bredde først eller dybde først
- For veldig mange grafproblemer har man ikke funnet *effektive* algoritmer.

# Grafteori - noen eksempler

# Eksempler på grafer

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.



# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.

## Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter:

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser, molekyler i kjemi

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser, molekyler i kjemi, datanettverk

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser, molekyler i kjemi, datanettverk, analyse av nettverkstrafikk. . .

# Eksempler på grafer

Grafer kan representere mange forskjellige ting.


- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser, molekyler i kjemi, datanettverk, analyse av nettverkstrafikk. . .
- Et *tre* er en spesiell type graf. Vi kommer til trær i kapittel 11.

# Eksempler på grafer


Grafer kan representere mange forskjellige ting.

- Nodene kan være studentene på Blindern, og kantene kan representere at to kjenner hverandre.
- Nodene kan være tilstandene som et dataprogram er i, og kantene kan representere overganger mellom tilstandene.
- En graf kan representere lenkestrukturen på et nettsted, hvor nodene er nettsider og kantene er lenker.
- Listen fortsetter: elektroniske kretser, molekyler i kjemi, datanettverk, analyse av nettverkstrafikk. . .
- Et *tre* er en spesiell type graf. Vi kommer til trær i kapittel 11.
- Vi skal se på flere eksempler på grafer før vi begynner med teorien.





- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*




- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*




- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*







- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*
- En annen mulighet er at




- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*
- En annen mulighet er at
  - nodene representerer *områder*, f.eks. fylker




- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*
- En annen mulighet er at
  - nodene representerer *områder, f.eks. fylker*
  - kantene representerer *grenser*



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*
- En annen mulighet er at
  - nodene representerer *områder, f.eks. fylker*
  - kantene representerer *grenser*
- Når vi har representasjonen, så kan vi egentlig glemme det opprinnelige kartet.



- Et kart kan gi utgangspunkt for flere forskjellige grafer.
- En mulighet er at
  - nodene representerer *byer*
  - kantene representerer *veier*
- En annen mulighet er at
  - nodene representerer *områder*, f.eks. fylker
  - kantene representerer *grenser*
- Når vi har representasjonen, så kan vi egentlig glemme det opprinnelige kartet.




# Veinett som grafer

# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.

# Veinett som grafer


- Et veinett kan representeres som en graf.






# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.




# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.




# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.
- Vi kan la *veiene* som forbinder kryssene svare til kantene.




# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.
- Vi kan la *veiene* som forbinder kryssene svare til kantene.




# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.
- Vi kan la *veiene* som forbinder kryssene svare til kantene.
- Når vi har tegnet opp grafen, så kan vi resonnerer om den i stedet for om selve veinettet.



# Veinett som grafer

- Et veinett kan representeres som en graf.
- Vi kan la hvert *kryss* svare til en node.
- Vi kan la *veiene* som forbinder kryssene svare til kantene.
- Når vi har tegnet opp grafen, så kan vi resonnerer om den i stedet for om selve veinettet.



# Endelige tilstandsmaskiner som grafer


# Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.




# Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.




# Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.
- Her kalles  $q_0$ ,  $q_1$ ,  $q_2$  og  $q_3$  *tilstander* og overgangene kalles *transisjoner*.




# Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.
- Her kalles  $q_0, q_1, q_2$  og  $q_3$  *tilstander* og overgangene kalles *transisjoner*.
- Vi har en starttilstand,  $q_0$  og en såkalt *aksepterende tilstand*,  $q_3$ .




## Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.
- Her kalles  $q_0$ ,  $q_1$ ,  $q_2$  og  $q_3$  *tilstander* og overgangene kalles *transisjoner*.
- Vi har en starttilstand,  $q_0$  og en såkalt *aksepterende tilstand*,  $q_3$ .
- Hvis vi begynner med tallet 1101 og følger kantene etter hvert som vi leser siffer, så ender vi opp i  $q_3$ . Siden det er en aksepterende tilstand, er 1101 *akseptert*.




## Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.
- Her kalles  $q_0$ ,  $q_1$ ,  $q_2$  og  $q_3$  *tilstander* og overgangene kalles *transisjoner*.
- Vi har en starttilstand,  $q_0$  og en såkalt *aksepterende* tilstand,  $q_3$ .
- Hvis vi begynner med tallet 1101 og følger kantene etter hvert som vi leser siffer, så ender vi opp i  $q_3$ . Siden det er en aksepterende tilstand, er 1101 *akseptert*.
- Tallet 100 aksepteres ikke, siden vi ender opp i tilstand  $q_0$ , som ikke er aksepterende.



## Endelige tilstandsmaskiner som grafer

- Vi kan tenke på *endelige tilstandsmaskiner* som grafer.
- Her kalles  $q_0$ ,  $q_1$ ,  $q_2$  og  $q_3$  *tilstater* og overgangene kalles *transisjoner*.
- Vi har en starttilstand,  $q_0$  og en såkalt *aksepterende* tilstand,  $q_3$ .
- Hvis vi begynner med tallet 1101 og følger kantene etter hvert som vi leser siffer, så ender vi opp i  $q_3$ . Siden det er en aksepterende tilstand, er 1101 *akseptert*.
- Tallet 100 aksepteres ikke, siden vi ender opp i tilstand  $q_0$ , som ikke er aksepterende.
- Ser du hvilke tall som aksepteres?



# Flytdiagrammer som grafer

# Flyttdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flyttdiagrammer* som grafer.




## Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.

# Flytdiagrammer som grafer


- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.



Input  $n$


## Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.




## Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.




## Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.




# Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.




# Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.



# Flytdiagrammer som grafer


- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.





## Flytdiagrammer som grafer

- Vi kan tenke på *flytdiagrammer* som grafer.
- I følgende eksempel representerer nodene programinstruksjoner.



- Hvilket program er dette?


# Flyttdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

# Flyttdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.


# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.




# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.




# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.




# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.



# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet


- Multiplikasjonsprinsippet igjen.





# Flytdiagrammer og multiplikasjonsprinsippet

- Multiplikasjonsprinsippet igjen.



# Grafteori - definisjoner og begreper

# Grafteori - definisjoner og begreper

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)

En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)

En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)

En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)

En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)

En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene
  - *vertex/vertices* om noder, og



# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)


En *graf*  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene
  - *vertex/vertices* om noder, og
  - *edges* om kanter.

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)



En graf  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene
  - *vertex/vertices* om noder, og
  - *edges* om kanter.
- Vi tegner noder slik: 

# Grafteori - definisjoner og begreper

## Definisjon (Graf)



En graf  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.

- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene
  - *vertex/vertices* om noder, og
  - *edges* om kanter.
- Vi tegner noder slik: 
- og kanter slik: 

# Grafteori - definisjoner og begreper


## Definisjon (Graf)

En graf  $G$  består av en ikke-tom mengde *noder*  $V$  og en mengde *kanter*  $E$ , slik at enhver kant forbinder nøyaktig to noder med hverandre eller en node med seg selv.


- Dette er med vilje litt upresist.
- Vi presiser heller etter hvert når vi trenger det.
- På engelsk brukes begrepene
  - *vertex/vertices* om noder, og
  - *edges* om kanter.
- Vi tegner noder slik: 
- og kanter slik: 
- Det er ikke viktig akkurat *hvordan* vi tegner grafer; det er *strukturen* i graf som er viktig, hvilke noder som er forbundet med hvilke via en kant.

# Grafteori - definisjoner og begreper

# Grafteori - definisjoner og begreper




# Grafteori - definisjoner og begreper



Her er A, B, C og D noder


# Grafteori - definisjoner og begreper



Her er A, B, C og D noder, mens e, f, g og h er kanter.



# Grafteori - definisjoner og begreper




Her er A, B, C og D noder, mens e, f, g og h er kanter.

## Definisjon (Inntil/naboer)

En kant ligger *inntil* (engelsk: *incident*) nodene som forbindes av den.

# Grafteori - definisjoner og begreper




Her er A, B, C og D noder, mens e, f, g og h er kanter.

## Definisjon (Inntil/naboer)

En kant ligger *inntil* (engelsk: *incident*) nodene som forbindes av den. To noder er *naboer* (engelsk: *adjacent*) hvis de forbindes av en kant.

# Grafteori - definisjoner og begreper




Her er A, B, C og D noder, mens e, f, g og h er kanter.

## Definisjon (Inntil/naboer)

En kant ligger *inntil* (engelsk: *incident*) nodene som forbindes av den. To noder er *naboer* (engelsk: *adjacent*) hvis de forbindes av en kant.

- Kanten e ligger inntil nodene A og B.

# Grafteori - definisjoner og begreper



Her er A, B, C og D noder, mens e, f, g og h er kanter.

## Definisjon (Inntil/naboer)

En kant ligger *inntil* (engelsk: *incident*) nodene som forbindes av den. To noder er *naboer* (engelsk: *adjacent*) hvis de forbindes av en kant.

- Kanten e ligger inntil nodene A og B.
- Nodene B og C er naboer, siden de forbindes av kanten f.

# Sammenhengende grafer

# Sammenhengende grafer

En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

# Sammenhengende grafer

En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

## Definisjon (Sammenhengende)


En graf er *sammenhengende* (engelsk: *connected*) hvis det er mulig å komme fra enhver node til enhver annen node ved å følge kantene.

# Sammenhengende grafer

En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

## Definisjon (Sammenhengende)

En graf er *sammenhengende* (engelsk: *connected*) hvis det er mulig å komme fra enhver node til enhver annen node ved å følge kantene.






# Sammenhengende grafer

En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

## Definisjon (Sammenhengende)

En graf er *sammenhengende* (engelsk: *connected*) hvis det er mulig å komme fra enhver node til enhver annen node ved å følge kantene.




En *sammenhengende* graf.

# Sammenhengende grafer


En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

## Definisjon (Sammenhengende)

En graf er *sammenhengende* (engelsk: *connected*) hvis det er mulig å komme fra enhver node til enhver annen node ved å følge kantene.



En *sammenhengende* graf.




# Sammenhengende grafer


En graf trenger ikke å være *sammenhengende*.

## Definisjon (Sammenhengende)

En graf er *sammenhengende* (engelsk: *connected*) hvis det er mulig å komme fra enhver node til enhver annen node ved å følge kantene.



En *sammenhengende* graf.



En *usammenhengende* graf.

# Tomme grafer og løkker

# Tomme grafer og løkker

En graf trenger ikke å ha noen kanter, men den må ha minst én node.

## Tomme grafer og løkker

En graf trenger ikke å ha noen kanter, men den må ha minst én node. Grafer uten kanter kalles *nullgrafer* eller *tomme grafer* (engelsk: *null graph*).

## Tomme grafer og løkker

En graf trenger ikke å ha noen kanter, men den må ha minst én node. Grafer uten kanter kalles *nullgrafer* eller *tomme grafer* (engelsk: *null graph*).



En tom graf.

## Tomme grafer og løkker

En graf trenger ikke å ha noen kanter, men den må ha minst én node. Grafer uten kanter kalles *nullgrafer* eller *tomme grafer* (engelsk: *null graph*).



En tom graf.

En graf kan ha *løkker* (engelsk: *loop*), en kant som går fra en node til den samme noden.



## Tomme grafer og løkker

En graf trenger ikke å ha noen kanter, men den må ha minst én node. Grafer uten kanter kalles *nullgrafer* eller *tomme grafer* (engelsk: *null graph*).



En tom graf.

En graf kan ha *løkker* (engelsk: *loop*), en kant som går fra en node til den samme noden.



En graf med en løkke.

# Parallele kanter og enkle grafer

## Parallele kanter og enkle grafer

En graf kan ha *parallele* kanter, to eller flere kanter som forbinder de samme to nodene.

## Parallele kanter og enkle grafer

En graf kan ha *parallele* kanter, to eller flere kanter som forbinder de samme to nodene.



En graf med parallelle kanter.

## Parallellle kanter og enkle grafer

En graf kan ha *parallellle* kanter, to eller flere kanter som forbinder de samme to nodene.



En graf med parallelle kanter.

### Definisjon (Enkel)

En graf er *enkel* (engelsk: *simple*) hvis den ikke har løkker eller parallelle kanter.

## Parallelle kanter og enkle grafer

En graf kan ha *parallelle* kanter, to eller flere kanter som forbinder de samme to nodene.



En graf med parallelle kanter.

### Definisjon (Enkel)

En graf er *enkel* (engelsk: *simple*) hvis den ikke har løkker eller parallelle kanter.

- Det er ganske vanlig å definere grafer slik at løkker og parallelle kanter ikke forekommer.

# Rettede grafer

# Rettede grafer

## Definisjon


En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.



# Rettete grafer

## Definisjon


En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.



# Rettede grafer

## Definisjon

En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.




- En *relasjon* kan ses på som en rettet graf.

# Rettete grafer

## Definisjon

En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.




- En *relasjon* kan ses på som en rettet graf.
- Denne grafen svarer til relasjonen  $\{\langle A, B \rangle, \langle B, C \rangle, \langle C, D \rangle, \langle D, A \rangle\}$ .

# Rettede grafer

## Definisjon

En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.




- En *relasjon* kan ses på som en rettet graf.
- Denne grafen svarer til relasjonen  $\{\langle A, B \rangle, \langle B, C \rangle, \langle C, D \rangle, \langle D, A \rangle\}$ .
- Hvis vi har en *symmetrisk* relasjon, riktignok, så kan vi tenke på denne som en vanlig (urettet) graf.

# Rettede grafer

## Definisjon

En *rettet graf* (engelsk: *directed*) er en graf hvor hver kant har en retning.



- En *relasjon* kan ses på som en rettet graf.
- Denne grafen svarer til relasjonen  $\{\langle A, B \rangle, \langle B, C \rangle, \langle C, D \rangle, \langle D, A \rangle\}$ .
- Hvis vi har en *symmetrisk* relasjon, riktignok, så kan vi tenke på denne som en vanlig (urettet) graf.
- Foreløpig skal vi ikke snakke om rettede grafer.

# Måter å tegne opp grafer på

# Måter å tegne opp grafer på

- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.

## Måter å tegne opp grafer på

- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.
- Vi bryr oss for eksempel ikke om hvor lange kantene er, om de er bøyd, etc.



## Måter å tegne opp grafer på

- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.
- Vi bryr oss for eksempel ikke om hvor lange kantene er, om de er bøyd, etc.
- Det eneste som spiller noen rolle er om to noder er forbundet med en kant.

## Måter å tegne opp grafer på

- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.
- Vi bryr oss for eksempel ikke om hvor lange kantene er, om de er bøyd, etc.
- Det eneste som spiller noen rolle er om to noder er forbundet med en kant.
- La oss se på noen eksempler. Følgende par av grafer er identiske, men tegnet opp på forskjellige måter.


## Måter å tegne opp grafer på


- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.
- Vi bryr oss for eksempel ikke om hvor lange kantene er, om de er bøyd, etc.
- Det eneste som spiller noen rolle er om to noder er forbundet med en kant.
- La oss se på noen eksempler. Følgende par av grafer er identiske, men tegnet opp på forskjellige måter.
- Vi forestiller oss at kantene er elastiske og at vi flytter om på nodene.

## Måter å tegne opp grafer på


- Det fins ikke noen unik måte å tegne opp en graf på.
- Vi bryr oss for eksempel ikke om hvor lange kantene er, om de er bøyd, etc.
- Det eneste som spiller noen rolle er om to noder er forbundet med en kant.
- La oss se på noen eksempler. Følgende par av grafer er identiske, men tegnet opp på forskjellige måter.
- Vi forestiller oss at kantene er elastiske og at vi flytter om på nodene.
- Vi skal etter hvert presisere dette gjennom begrepet *isomorfi*. Følgende par av grafer kalles *isomorfe*.









er lik




er lik









er lik







er lik





er lik







er lik




er lik












er lik





er lik







er lik









er lik




er lik







er lik



er lik



# Graden til noder

# Graden til noder

## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ .

# Graden til noder

## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter.

# Graden til noder

## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\deg(v)$  mener vi graden til  $v$ .

# Graden til noder


## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\deg(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.

# Graden til noder

## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\deg(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.






# Graden til noder

## Definisjon (Grad)


*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\deg(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

## Definisjon (Grad)


Graden (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\text{deg}(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

## Definisjon (Grad)


*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\text{deg}(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

## Definisjon (Grad)


*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\text{deg}(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

## Definisjon (Grad)


Graden (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\text{deg}(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

## Definisjon (Grad)

*Graden* (engelsk: *degree*) til en node  $v$  er antall kanter som ligger inntil  $v$ . En løkke teller som to kanter. Med  $\text{deg}(v)$  mener vi graden til  $v$ . En node med grad 0 kalles *isolert*.



# Graden til noder

# Graden til noder

## Teorem



# Graden til noder

## Teorem

Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter.

# Graden til noder

## Teorem

Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter. Hvis  $V$  er mengden av noder og  $E$  er mengden av kanter, så har vi

# Graden til noder

## Teorem

Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter. Hvis  $V$  er mengden av noder og  $E$  er mengden av kanter, så har vi

$$\sum_{v \in V} \deg(v) =$$

# Graden til noder

## Teorem

Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter. Hvis  $V$  er mengden av noder og  $E$  er mengden av kanter, så har vi

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

# Graden til noder

## Teorem

Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter. Hvis  $V$  er mengden av noder og  $E$  er mengden av kanter, så har vi

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

- Hver *kant* som legges til i en graf vil øke summen av gradene med to.

# Graden til noder

## Teorem


Summen av gradene til alle nodene i en graf er lik 2 ganger antallet kanter. Hvis  $V$  er mengden av noder og  $E$  er mengden av kanter, så har vi

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

- Hver *kant* som legges til i en graf vil øke summen av gradene med to.
- La oss se på et eksempel.


# Graden til noder

## Graden til noder






## Graden til noder




Antall kanter er

## Graden til noder




Antall kanter er 4.

## Graden til noder



Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er


## Graden til noder




Antall kanter er 4.

Summen av gradene er 8.


## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.



## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




Antall kanter er

## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




Antall kanter er 5.



## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




Antall kanter er 5.  
Summen av gradene er

## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




Antall kanter er 5.  
Summen av gradene er 10.

## Graden til noder




Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.




Antall kanter er 5.  
Summen av gradene er 10.

Bevis

## Graden til noder



Antall kanter er 4.  
Summen av gradene er 8.



Antall kanter er 5.  
Summen av gradene er 10.

### Bevis

Hvis vi legger sammen gradene til alle nodene, så vil hver kant telle to ganger, siden hver kant ligger inntil to noder.




## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.


## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.



## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.




Her er det 6 noder (markert med rødt) med odde grad.




## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.




Her er det 6 noder (markert med rødt) med odde grad.




## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.




Her er det 6 noder (markert med rødt) med odde grad.





Her er det 2 noder av odde grad.

## Lemma (håndhilselemmaet)

Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.




Her er det 6 noder (markert med rødt) med odde grad.




Her er det 2 noder av odde grad.

## Lemma (håndhilselemmaet)


Det er alltid et partall antall noder av odde grad i en graf.



Her er det 6 noder (markert med rødt) med odde grad.



Her er det 2 noder av odde grad.



Her er det 2 noder av odde grad.

# Håndhilselemmaet

# Håndhilselemmaet

- Hvis vi forestiller oss mange mennesker samlet i et rom og at man håndhilser på hverandre, så må antallet av de som håndhilser på et odde antall personer være et partall.

# Håndhilselemmaet

- Hvis vi forestiller oss mange mennesker samlet i et rom og at man håndhilser på hverandre, så må antallet av de som håndhilser på et odde antall personer være et partall.
- Vi kan representere denne situasjonen ved å representere menneskene som noder. En kant vil da representere at to personer håndhilser på hverandre.

# Håndhilselemmaet

- Hvis vi forestiller oss mange mennesker samlet i et rom og at man håndhilser på hverandre, så må antallet av de som håndhilser på et odde antall personer være et partall.
- Vi kan representere denne situasjonen ved å representere menneskene som noder. En kant vil da representere at to personer håndhilser på hverandre.
- Det kalles et lemma fordi det ikke er så interessant i seg selv, men er nyttig for å bevise andre lemmaer og teoremer.



# Håndhilselemmaet

- Hvis vi forestiller oss mange mennesker samlet i et rom og at man håndhilser på hverandre, så må antallet av de som håndhilser på et odde antall personer være et partall.
- Vi kan representere denne situasjonen ved å representere menneskene som noder. En kant vil da representere at to personer håndhilser på hverandre.
- Det kalles et lemma fordi det ikke er så interessant i seg selv, men er nyttig for å bevise andre lemmaer og teoremer.
- Vi skal nå bevise håndhilselemmaet.

# Bevis (håndhilselemmaet)

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf.

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde)

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne).

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v)$$



## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v)$$

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v)$$

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

Siden  $2|E|$  er et partall

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

Siden  $2|E|$  er et partall og summen av gradene til nodene i  $V_p$  er et partall

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

Siden  $2|E|$  er et partall og summen av gradene til nodene i  $V_p$  er et partall, så må summen av gradene til nodene i  $V_o$  også være et partall.



## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

Siden  $2|E|$  er et partall og summen av gradene til nodene i  $V_p$  er et partall, så må summen av gradene til nodene i  $V_o$  også være et partall. Siden hver node i  $V_o$  har odde grad

## Bevis (håndhilselemmaet)

La  $G$  være en graf. Vi deler mengden  $V$  av noder inn to:  $V_o$  er de som har odde grad (de som var røde) og  $V_p$  er de som har lik grad (de som var grønne). Vi har vist et teorem som sier at summene av gradene til *alle* nodene er to ganger antall kanter.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Siden vi har delt opp mengden av noder i to, kan vi skrive dette slik:

$$\sum_{v \in V_o} \deg(v) + \sum_{v \in V_p} \deg(v) = 2|E|$$

Siden  $2|E|$  er et partall og summen av gradene til nodene i  $V_p$  er et partall, så må summen av gradene til nodene i  $V_o$  også være et partall. Siden hver node i  $V_o$  har odde grad, så må det være et partall antall av dem.

# Komplette grafer

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

# Komplette grafer


## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)


En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)


En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.






# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)


En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)


En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ).

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3, K_4, K_5, K_6, K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.  $K_4$  har 6 kanter.

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.  $K_4$  har 6 kanter.  $K_5$  har 10 kanter.

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



Komplette grafer ( $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ).


- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.  $K_4$  har 6 kanter.  $K_5$  har 10 kanter.  $K_6$  har 15 kanter.



# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.




Komplette grafer ( $K_3, K_4, K_5, K_6, K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.  $K_4$  har 6 kanter.  $K_5$  har 10 kanter.  $K_6$  har 15 kanter.  $K_7$  har 21 kanter.

# Komplette grafer

## Definisjon (Komplett graf)

En enkel graf er *komplett* hvis hver node er nabo med enhver annen node.



Komplette grafer ( $K_3, K_4, K_5, K_6, K_7$ ).

- Hvor mange kanter er det i en komplett graf?
- $K_3$  har 3 kanter.  $K_4$  har 6 kanter.  $K_5$  har 10 kanter.  $K_6$  har 15 kanter.  $K_7$  har 21 kanter. Er det noen som ser et mønster?

# Komplette grafer

# Komplette grafer

## Teorem

# Komplette grafer

## Teorem

Det er  $\binom{n}{2}$  kanter i en komplett graf med  $n$  noder.

# Komplette grafer

## Teorem

Det er  $\binom{n}{2}$  kanter i en komplett graf med  $n$  noder.

- Det er fordi vi har en kant for hver mengde av noder med kardinalitet 2.

# Komplette grafer

## Teorem

Det er  $\binom{n}{2}$  kanter i en komplett graf med  $n$  noder.

- Det er fordi vi har en kant for hver mengde av noder med kardinalitet 2.
- $K_n$  representerer kampoppsettet i en enkel serie som omfatter  $n$  lag.

# Komplette grafer

## Teorem

Det er  $\binom{n}{2}$  kanter i en komplett graf med  $n$  noder.

- Det er fordi vi har en kant for hver mengde av noder med kardinalitet 2.
- $K_n$  representerer kampoppsettet i en enkel serie som omfatter  $n$  lag.
- For det vanlige oppsettet med hjemme- og bortekamper vil kampoppsettet representeres av en komplett **rettet** graf.



# Komplementet til en graf

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf.

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene *ikke* er naboer i  $G$ .

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene *ikke* er naboer i  $G$ . Vi skriver  $\overline{G}$  for komplementet til  $G$ .

# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene *ikke* er naboer i  $G$ . Vi skriver  $\overline{G}$  for komplementet til  $G$ .

Vi skal se på noen grafer og deres komplementer.




# Komplementet til en graf

## Definisjon (Komplement)

La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene *ikke* er naboer i  $G$ . Vi skriver  $\overline{G}$  for komplementet til  $G$ .

Vi skal se på noen grafer og deres komplementer.





# Komplementet til en graf


## Definisjon (Komplement)



La  $G$  være en enkel graf. Da er *komplementet* til  $G$  grafen som har de samme nodene som  $G$ , men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene *ikke* er naboer i  $G$ . Vi skriver  $\overline{G}$  for komplementet til  $G$ .




Vi skal se på noen grafer og deres komplementer.



























- I det siste tilfellet fikk vi ikke noen *ny* graf når vi tok komplementet.





- I det siste tilfellet fikk vi ikke noen *ny* graf når vi tok komplementet.
- Slike grafer kalles *selv-komplementære*.

# Matriserepresentasjoner

# Matriserepresentasjoner


På samme måte som med relasjoner, så har grafer en matriserepresentasjon.

# Matriserepresentasjoner

På samme måte som med relasjoner, så har grafer en matriserepresentasjon. Vi kaller en slik matrise for en *koblingsmatrise* (engelsk: *adjacency matrix*).


# Matriserepresentasjoner

På samme måte som med relasjoner, så har grafer en matriserepresentasjon. Vi kaller en slik matrise for en *koblingsmatrise* (engelsk: *adjacency matrix*).



# Matriserepresentasjoner

På samme måte som med relasjoner, så har grafer en matriserepresentasjon. Vi kaller en slik matrise for en *koblingsmatrise* (engelsk: *adjacency matrix*).




$$\begin{array}{c} \phantom{A} \\ A \\ B \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \left[ \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

På samme måte som med relasjoner, så har grafer en matriserepresentasjon. Vi kaller en slik matrise for en *koblingsmatrise* (engelsk: *adjacency matrix*).



|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 |

Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner



# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ ,

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\ \text{A} \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ \text{B} \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ \text{C} \left[ \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \end{array} \right] \end{array} \right]$$

Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\ \text{A} \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ \text{B} \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2 \\ \text{C} \left[ \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \end{array} \right] \end{array} \right]$$



Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \phantom{A} \phantom{B} \phantom{C} \\ \phantom{A} \phantom{B} \phantom{C} \\ A \phantom{B} \phantom{C} \\ B \phantom{A} \phantom{C} \\ C \phantom{A} \phantom{B} \end{array} \begin{bmatrix} & A & B & C \\ & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 & 2 \\ & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \phantom{A} \phantom{B} \phantom{C} \\ \phantom{A} \phantom{B} \phantom{C} \\ A \phantom{B} \phantom{C} \\ B \phantom{A} \phantom{C} \\ C \phantom{A} \phantom{B} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



Koblingsmatrisen til grafen.




# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \end{array} \begin{bmatrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$




Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \phantom{A} \\ \phantom{B} \\ \phantom{C} \end{array} \begin{array}{ccc} A & B & C \\ \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$




Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

## Definisjon (Koblingsmatrise)

Hvis  $G$  er en graf med  $n$  noder,  $v_1, \dots, v_n$ , så er koblingsmatrisen til  $G$  en  $n$ -ganger- $n$ -matrise hvor tallet i rad  $i$  og kolonne  $j$  er antall kanter mellom  $v_i$  og  $v_j$ .

$$\begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \end{array} \begin{bmatrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



Koblingsmatrisen til grafen.

# Matriserepresentasjoner

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.
- Hvis vi ser på rettede grafer, så kan vi ikke speile matrisen om diagonalen.

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.
- Hvis vi ser på rettede grafer, så kan vi ikke speile matrisen om diagonalen.
- Vi kunne også speile om diagonalen for *symmetriske relasjoner*.



# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.
- Hvis vi ser på rettede grafer, så kan vi ikke speile matrisen om diagonalen.
- Vi kunne også speile om diagonalen for *symmetriske relasjoner*.
- En forskjell mellom symmetriske relasjoner og grafer er at vi tillater *parallelle* kanter i grafene.

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.
- Hvis vi ser på rettede grafer, så kan vi ikke speile matrisen om diagonalen.
- Vi kunne også speile om diagonalen for *symmetriske relasjoner*.
- En forskjell mellom symmetriske relasjoner og grafer er at vi tillater *parallelle* kanter i grafene.
- De kan vi ikke fange inn ved hjelp av en relasjon.

# Matriserepresentasjoner

- Legg merke til at vi kan speile en matrise om diagonalen.
- Det er fordi vi kun ser på *urettede* grafer.
- Hvis vi ser på rettede grafer, så kan vi ikke speile matrisen om diagonalen.
- Vi kunne også speile om diagonalen for *symmetriske relasjoner*.
- En forskjell mellom symmetriske relasjoner og grafer er at vi tillater *parallelle* kanter i grafene.
- De kan vi ikke fange inn ved hjelp av en relasjon.
- Det fins flere matriser for samme graf, avhengig av rekkefølgen vi gir nodene i.