

MAT1030 – Diskret Matematikk

Forelesning 13: Funksjoner

Dag Normann

Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

2. mars 2010

(Sist oppdatert: 2010-03-02 14:14)



Kapittel 6: Funksjoner

Forrige uke

- Forrige forelesning snakket vi om relasjoner.
- Vi snakket om ekvivalensrelasjoner og ekvivalensklasser.
- Vi definerte partielle ordninger og totale ordninger.
- Deretter begynte vi å snakke litt om funksjoner.
- Det skal vi fortsette med nå.
- Vi gjentar de siste minuttene fra onsdag.
- Før det: Er det noen spørsmål?

Funksjoner

- Fra skolematematikken kjenner man funksjoner definert ved uttrykk som
 - $f(x) = x^2 + 3x + 4$
 - $g(x) = \sin x$
 - $h(x) = e^{2 \ln(x) + 27}$
- Vi har også støtt på tallteoretiske funksjoner som
 - Heltallsverdien til $\frac{n}{m}$.
 - Primtall nr. n .
 - Største felles divisor av n og m .

Funksjoner

Felles for alle disse eksemplene er at det er en sammenheng mellom

argumentet eller argumentene
til funksjonen, og

verdien
til funksjonen.

Funksjoner

Det er vanlig å fremstille en funksjon som en slags svart boks hvor

- Vi forer boksen med funksjonsargumentene.
- Boksen bearbeider dataene.
- Boksen gir oss funksjonsverdien.

Som intuitivt bilde er dette en grei beskrivelse.

Som presis matematisk definisjon holder det ikke helt.

Vi skal stort sett holde oss til presisjonsnivået i boka.

Hovedpoenget er at vi skal tolke ordet *regel* på neste side så liberalt som mulig.

For fullstendighetens skyld, skal vi, om noen minutter, ta med den vanlige formelle definisjonen av hva en funksjon er.

Funksjoner

Definisjon

La X og Y være to mengder.

En **funksjon** $f: X \rightarrow Y$ er en regel som for hver $x \in X$ gir oss en, og bare en, $y = f(x)$ i Y .

Merk

- Som sagt skal ordet *regel* tolkes så liberalt som mulig, men, som vi skal se, med en smule forsiktighet.
- Det er ikke noe krav om at det skal foreligge noen regler som mennesker eller maskiner kan følge.
- Det eneste kravet er at $f(x)$ skal fins i Y , og at uttrykket $f(x)$ ikke kan være flertydig.

Eksempler

Eksempel (Funksjoner)

- Vi skal se på noe av det vi har snakket om før, og se hvorvidt funksjoner er involvert.
- Vi skal legge vekt på andre eksempler enn de dere kjenner fra skolematematikken.
- La \mathcal{E} være en universell mengde, og la A være en delmengde av \mathcal{E} .
- Vi definerte $\bar{A} = \{x \in \mathcal{E} : x \notin A\}$.
- Hver A har en og bare en komplement-mengde, så $f(A) = \bar{A}$ er en funksjon.
- Her er X lik Y lik potensmengden til \mathcal{E} .
- På samme måte kan vi oppfatte \cap og \cup som funksjoner.
- Hvis Y er potensmengden til \mathcal{E} og $X = Y^2$, vil \cap og \cup være funksjoner fra X til Y .

Eksempler

Eksempel

- **Quicksort** er en algoritme som sorterer elementene i en liste etter størrelse.
- Quicksort gir mening hver gang listen er hentet fra en totalt ordnet mengde.
- Da **beregner** Quicksort funksjonen som tar en vilkårlig liste som argument og gir den sorterte listen som verdi.
- Vi kan finne en annen algoritme **Slowsort** for sortering av elementene i en liste, og den vil definere den samme funksjonen, men være en annen algoritme.
- Det er forbindelsen mellom argument og verdi som bestemmer hvilken funksjon vi har, ikke hvordan vi kommer fra argument til verdi.

Definisjonsområdet og verdiområdet

Definisjon

- a) Hvis $f : X \rightarrow Y$ er en funksjon kaller vi
- X for **definisjonsområdet** til f .
 - Y for **verdiområdet** til f .
- b) **Bildet** eller **bildemengden** til f er

$$\{f(x) : x \in X\}$$

- c) Vi kan skrive $f[X]$ for bildet til f .

Definisjonsområdet og verdiområdet

Eksempel

- Definer $f(x) = e^x$ som en funksjon fra \mathbb{R} til \mathbb{R} .
Da vil:
 - *Definisjonsområdet* til f være hele \mathbb{R} .
 - *Verdiområdet* til f være hele \mathbb{R} .
 - *Bildet* til f være mengden av positive reelle tall.

Definisjonsområdet og verdiområdet

Eksempel

- La $A \subseteq \mathcal{E}$ være en mengde, og definer

$$f_A(B) = A \cap B$$

- som en funksjon fra potensmengden X til \mathcal{E} til seg selv.
- Da er X både definisjonsområdet og verdiområdet til f_A , mens bildemengden vil være potensmengden til A .

Definisjonsområdet og verdiområdet

Eksempel

- Innledningsvis i disse forelesningene konstruerte vi en pseudokode for å beregne $|n - m|$ fra n og m .
- I dette tilfellet var definisjonsområdet mengden av par av ikke-negative hele tall, verdiområdet og bildemengden lik mengden av ikke-negative hele tall.
- Da vi satte opp sannhetsverditabeller for sammensatte utsagn i utsagnsvariablene p , q og r , konstruerte vi i virkeligheten funksjoner fra mengden X av tripler fra $\{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ til $Y = \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$.
To sammensatte utsagn er logisk ekvivalente når disse funksjonene er like.

Definisjonsområdet og verdiområdet

- En sannhetsverditabell beskriver egentlig en funksjon på **tabellform**.
- I prinsippet kan alle funksjoner hvor definisjonsområdet er en liten, endelig mengde beskrives på tabellform.
- Vi illustrerer det på tavlen.
- En alternativ måte å beskrive slike funksjoner er ved å bruke et **pildiagram**, se illustrasjon på tavlen.

Definisjonsområdet og verdiområdet

Merk

- Læreboka bruker *domain* for definisjonsområde og *codomain* for verdiområde.
- Det er ikke uvanlig å bruke ordene *domene* og *kodomene* på norsk.
- Vi skal holde oss til betegnelsene *definisjonsområde* og *verdiområde* i disse forelesningene.

Definisjonsområdet og verdiområdet

Hvis vi skal gi en enda mer stringent innføring i funksjoner, kan vi definere en funksjon som følger:

En **funksjon** fra A til B er en delmengde $f \subseteq A \times B$ slik at

- For alle $a \in A$ finnes en og bare en $b \in B$ slik at $(a, b) \in f$.
- Vi skriver $b = f(a)$ for $(a, b) \in f$.

Hvis man skal bruke mengdelæren til å legge et grunnlag for matematikken, er dette den **offisielle** definisjonen av hva en funksjon er.

Her er **regelen** for å beregne $f(a)$ at

$f(a)$ er den b som er slik at $(a, b) \in f$.

Vi skal fortsette med det presisjonsnivået vi har lagt opp til.

Injektive funksjoner

- Funksjoner har en ting felles med relasjoner: Noen av dem har spesielle egenskaper som er verd en egen betegnelse.
- Vi skal først se på [injektive funksjoner](#).
- Andre betegnelser er [1-1-funksjoner](#) og [enentydige funksjoner](#).

Injektive funksjoner

Eksempel (Injektive funksjoner)

- La w være et 32-bits binært tall, og la $f(w)$ være det heltallet som representeres av w .
- Hvis $v \neq w$ vil $f(v) \neq f(w)$ siden vi ikke bruker to forskjellige binære representasjoner av det samme tallet.
- Hvis vi oppfatter f som en *input-output*-forbindelse, ser vi at det er én input per output.
- Dette er et eksempel på en en-til-en-funksjon eller *injektiv* funksjon.

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- En telefonselger vil ha datastøttet oppringing til kunder.
- For ikke å irritere kundene unødig, bør ikke telefonselgeren kontakte samme kunde to ganger.
- Hvis $R(n)$ er kunde nummer n selgeren kontakter, betyr dette kravet at $R(n) \neq R(m)$ når $n \neq m$.
- Programmet selgeren støtter seg på må være slik at oppringningsfunksjonen R blir injektiv, eller [enentydig](#).

Injektive funksjoner

Den formelle definisjonen vil være:

Definisjon

La $f : X \rightarrow Y$ være en funksjon.

f kalles [injektiv](#) hvis vi for alle x og y i X har at

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y).$$

Injektive funksjoner

Merk

- Vi har brukt den kontrapositive versjonen i definisjonen.
En ekvivalent formulering vil være

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Injektive funksjoner

Eksempel (Injektive funksjoner)

- La $f(x) = x^2$ være en funksjon fra \mathbb{R} til \mathbb{R} .
Da er ikke f injektiv fordi $1 \neq -1$ mens $f(1) = f(-1)$.
- Hvis vi begrenser definisjonsområdet til de ikke-negative tallene $\mathbb{R}_{\geq 0}$ blir funksjonen injektiv.
- Funksjonen som ordner en sekvens av ord alfabetisk er ikke injektiv, fordi ord-sekvensene “Per, Pål, Espen” og “Eспен, Pål, Per” er forskjellige, men de blir like når vi ordner dem alfabetisk.

Injektive funksjoner

Eksempel

- La $A = \{1, \dots, 100\}$
- La $f(a)$ være tverrsummen til $a \in A$ når vi antar at vi bruker vanlig tittallsystem.
- f er en funksjon, hvor A er **definisjonsområdet**.
- I dette tilfellet har vi ikke bestemt **verdiområdet**, men uten å tenke oss om vet vi at tverrsummen vil være et naturlig tall.
- Vi ser derfor på f som en funksjon

$$f : A \rightarrow \mathbb{N}$$

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- Er f injektiv?
- Kravet var at for alle a og b i A , så skal $f(a) \neq f(b)$ når $a \neq b$.
- Men $f(63) = f(72) = 9$, så f er ikke injektiv.
- Kan vi bestemme bildemengden til f ?
- Bildemengden vil være $B = \{1, 2, 3, 4, \dots, 18\}$.

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- Vi definerer nå to relasjoner på A ved hjelp av f :
- La aRb hvis $f(a) = f(b)$.
- La aSb hvis $f(a) < f(b) \vee (aRb \wedge a \leq b)$
- Når vi har relasjoner som dette, bør vi stille følgende spørsmål:
 - Er R eller S refleksiv?
 - Er R eller S irrefleksiv?
 - Er R eller S symmetrisk?
 - Er R eller S antisymmetrisk?
 - Er R eller S transitiv?

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- La oss se på R først.
 1. Vi ser at R er *refleksiv* fordi $f(a) = f(a)$ for alle $a \in A$.
 2. Vi ser at R er *symmetrisk* fordi $f(b) = f(a)$ når $f(a) = f(b)$.
 3. Vi ser at R er *transitiv* fordi $f(a) = f(c)$ hvis vi har at $f(a) = f(b)$ og at $f(b) = f(c)$.
 4. Siden $A \neq \emptyset$ og R er refleksiv, er ikke R samtidig *irrefleksiv*.
 5. Siden f ikke er injektiv og R er symmetrisk, kan ikke R være *antisymmetrisk*.
- 1., 2. og 3. viser at R er en **ekvivalensrelasjon**.
- Vi har ikke brukt noen spesielle egenskaper ved A eller f , så relasjoner konstruert på denne måten vil **alltid** være ekvivalensrelasjoner.

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- Når vi nå vet at R er en ekvivalensrelasjon, kan vi prøve å finne **ekvivalensklassene**.
- Vi vil ha en ekvivalensklasse for hver tverrsum:
 1. $\{1, 10, 100\}$
 2. $\{2, 11, 20\}$
 3. $\{3, 12, 21, 30\}$
 4. $\{4, 13, 22, 31, 40\}$
 5. $\{5, 14, 23, 32, 41, 50\}$
OSV.

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- La oss så se på egenskapene til S .
- $aSb \Leftrightarrow f(a) < f(b) \vee (aRb \wedge a \leq b)$
 - S er *refleksiv* fordi $aRa \wedge a \leq a$ for alle a , så andre ledd i disjunksjonen er alltid sant.
 - La aSb og bSc .
 - Hvis $f(a) < f(b)$ eller $f(b) < f(c)$ vil $f(a) < f(c)$, og aSc .
 - Hvis $f(a) = f(b) = f(c)$ har vi at $a \leq b \leq c$, så da har vi også at aSc .
 - Vi ser at S er *transitiv*.
 - Anta at aSb og bSa
 - Da må $f(a) \leq f(b)$ og $f(b) \leq f(a)$, så $f(a) = f(b)$, det vil si at aRb .
 - Da er $a \leq b$ og $b \leq a$ så $a = b$
 - Det følger at S er *antisymmetrisk*.
- Konklusjonen er at S er en partiell ordning.

Injektive funksjoner

Følgende oppgave skal leses i sammenheng med teksten på de foregående sidene.

Oppgave

Vis at S er en total ordning, og skriv ned de 10 S -første tallene.

Injektive funksjoner

Eksempel (Injektive funksjoner)

- Vi skal se på tre funksjoner, og spørre om de er injektive:
 1. A er alle ord w godkjent som norske ord, og $f(w)$ er ordet w skrevet baklengs.
 2. B er mengden av uendelige desimalutviklinger α og $g(\alpha)$ er det tilsvarende reelle tallet.
 3. C er mengden av positive reelle tall som har en eksakt 32-bits representasjon r , og hvis r representerer tallet x lar vi $h(r)$ være tallet som representerer \sqrt{x} .
- f vil være injektiv, for hvis vi speiler to forskjellige ord, vil speilbildene bli forskjellige.

Injektive funksjoner

Eksempel (Fortsatt)

- g er ikke injektiv fordi noen reelle tall kan ha to forskjellige desimalutviklinger, eksempelvis

$$0,9999\dots = 1,0000\dots$$

- h kan ikke være injektiv fordi hvis et tall ligger mellom 2^{-24} og 2^{24} , vil kvadratroten ligge mellom 2^{-12} og 2^{12} .

Vi har altså langt færre binære tall til disposisjon for å representere \sqrt{x} enn x selv, så funksjonen kan ikke være injektiv.

- Her har vi egentlig brukt noe som kalles [skuffeprikket](#), [dueslagsprikket](#) eller på engelsk [the pigeon hole principle](#).