

### **PBL oppgave 3:      *Anestesi er ikke bare, bare***

Karin Bang er en voksen student på 32 år. En visdomstann i underkjeven har plaget henne i den senere tid, slik at hun ikke får konsentrert seg om lesingen. Hun er innflytter til byen og kommer til din praksis for første gang for å få hjelp. Hun er ganske liten av vekst. Ved den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen finner du et dypt hull i visdomstannen på høyre side i underkjeven. Hun har en hoven og øm lymfeknute ved kjevevinkelen på høyre side. Du bedømmer det slik at visdomstannen må ekstraheres.

Idet du gjør klar en sprøyte for injeksjon, ser pasienten litt redd og skeptisk ut. Hun forteller at da hun skulle ekstrahere en visdomstann i overkjeven for et par år siden, førte bedøvelsen til at hun fikk en stor hevelse i kinnet som varte i noen uker og som ble rød/blå/gul. Du lover å være forsiktig slik at noe lignende ikke skjer igjen. Du setter en mandibularis-anestesi for å bedøve gingiva lingualt for tannen og selve visdomstannen. Aspirasjon viser ikke blod i noen fase av injeksjonen. Det går tilsynelatende greit, men akkurat da du skal sette en annen anestesi for å bedøve gingiva facialt for tannen, observerer du at uttrykket i Karins ansikt forandres slik at hun ser skjev ut; mimikken på høyre siden fungerer ikke.