

Oppsummering matematikkdel

ECON 2200

Kjell Arne Brekke

Økonomisk Institutt

May 6, 2010

- Rekker bare å nevne noen hovedpunkter
- Alt er likevel pensum, selv om det ikke blir nevnt her! .

- Vi har brukt det hele veien
- Ikke tid til en oppsummering her
- Er du usikker?:

$$(c + k)y = cy + ky$$
$$\frac{2}{x + 2} \text{ korte bort 2?}$$

$$p(1 - t) - ky = 0 \text{ l\o os for } y$$

- Definisjon. Lar h gå mot null i uttrykket

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Tolkning, ofte er $h = 1$ lite nok, og det kan tolkes som verdien av den siste/neste enheten

$$f'(x) \approx f(x+1) - f(x)$$

- Fundamentale derivasjonsregler. Kan du derivere

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 4$$

og finne

$$f'(x) = 6x + 2 \quad ?$$

- Tre regler

Produkt : $F(x) = f(x)g(x) \implies F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

Brøk : $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \implies F'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

Kjerneregul : $F(x) = f(g(x)) \implies F'(x) = f'(g(x))g'(x)$

- Eksempel 1

$$F(y) = p(y)y$$

her bruker vi produktregelen (Tenk på det som $f(y)g(y)$ der $f(y) = p(y)$ og $g(y) = y$).

$$F'(y) = p'(y)y + p(y)$$

Litt mer komplekse derivasjonsregler, II

- Eksempel 2:

$$F(x) = \frac{\ln x}{x}$$

gir ved brøkregelen

$$F'(x) = \frac{\frac{1}{x}x - \ln(x)}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

- Eksempel 3

$$F(x) = e^{x^2} = f(g(x))$$

der

$$\begin{aligned}f(u) &= e^u \\ u &= g(x) = x^2\end{aligned}$$

Som gir

$$F'(x) = f'(u)g'(x) = e^u 2x = 2xe^{x^2}$$

- Eksempel $g(x) = 3x^2$

$$g'(x) = 3 \cdot 2x = 6x$$

Deriverer en gang til

$$g''(x) = 6$$

- Positiv \rightarrow smilemunn: $g'' > 0$ betyr at funksjonen er konveks, den krummer oppover og et stasjonærpunkt er en minimum.
- Negativ \rightarrow surmunn: $g'' < 0$ betyr at funksjonen er konkav og krummer nedover og et stasjonærpunkt er en maksimum.

- Eksempel $g(x) = 3x^2$

$$\frac{g'(x)x}{g(x)} = \frac{dg}{dx} \frac{x}{g} = \frac{6x \cdot x}{3x^2} = 2$$

- Tolkning: Den prosentvise endring i g ved en prosents endring i x .
- Om det gjør det klarere for noen:

$$\frac{dg}{dx} \frac{x}{g} = \left(\frac{dg}{g} \right) / \left(\frac{dx}{x} \right)$$

Maksimering (minimering tilsvarende)


- Finner stasjonærpunkt

$$f'(c) = 0$$

- Er et maksimum om

$$f'(x) \begin{cases} > 0 & \text{for } x < c \\ < 0 & \text{for } x > c \end{cases}$$


- Illustrasjon:



- Er minimum om

$$f'(x) \begin{cases} < 0 & \text{for } x < c \\ > 0 & \text{for } x > c \end{cases} .$$


- Men selv om $f'(c) = 0$, trenger det ikke være min/maks



Andreordensbetingelser

- $f''(x) > 0$ for alle x tilsier minimum
- $f''(x) < 0$ for alle x tilsier maksimum
- Illustrasjon, $f''(x) < 0$ betyr at $f'(x)$ faller, så

$$f'(x) \begin{cases} > 0 & \text{for } x < c \\ < 0 & \text{for } x > c \end{cases}$$



- Noen funksjoner er implisitt definert gjennom en ligning

$$g(f(x), x) = 0$$

- I økonomi er ligningen gjerne en 1. ordens betingelse ($\max_x pf(x) - cx$).

$$pf'(x^*(c)) = c$$

en markedslikevekt

$$D(p(t)) = S(p(t) - t)$$

eller en nivåkurve

$$f(k(n), n) = x_0$$

Implisitt derivasjon (eksempel)

- 1.ordensbetingelsen

$$pf'(x^*(c)) = c$$

- Deriver ligningen mhp argumentet. Her er x en funksjon av c , så vi deriverer m.h.p. c :

$$pf''(x^*)x^{*'}(c) = 1$$
$$x^{*'}(c) = \frac{1}{pf''(x^*)} < 0$$

- Fortegnet bestemmes gjerne av andreordensbetingelsen
- Når vi spør om effekten på en variabel som ikke er bestemt av ligningen, sett inn (hvordan påvirker en endring i c profitten)

$$\pi = pf(x^*) - cx^*$$
$$\frac{d\pi}{dc} = \frac{\partial\pi}{\partial x}x^{*'}(c) + \frac{\partial\pi}{\partial c} = 0 - x^* = -x^*$$

- Eksempler nyttefunksjoner $u(x, y)$ produktfunksjoner $F(K, L)$ osv.
- Partiellderiverer, deriverer mhp en variabel og holder den andre fast

$$\begin{aligned}f(x, y) &= yx^2 \\g(x) &= 3x^2\end{aligned}$$

Derivasjon av g og partiell derivasjon av f mhp x blir helt tilsvarende

$$\begin{aligned}g'(x) &= 3 \cdot 2x = 6x \\f'_x(x, y) &= y \cdot 2x = 2xy\end{aligned}$$

- Kjernerregelen

$$\begin{aligned}g(x) &= F(2x, x^2) \\g'(x) &= 2F'_1 + F'_2 \cdot 2x\end{aligned}$$

- Differensialer

$$u(x, y)$$
$$du = u'_x dx + u'_y dy$$

- Kan brukes til implisitt derivasjon: $y(x)$ gitt ved

$$u(x, y(x)) = u_0$$

betyr at

$$du = 0$$

gir

$$0 = u'_x dx + u'_y dy$$

som løses til

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{u'_x}{u'_y}$$

Maksimering med to variabler

- Søker fortsatt etter stasjonærpunkter:

$$f'_x(x_0, y_0) = 0$$

$$f'_y(x_0, y_0) = 0$$

- Om $f(x, y)$ har et maksimum i $x = x_0, y = y_0$ så må funksjonen

$$g(x) = f(x, y_0)$$

ha et maksimum i $x = x_0$ Altså

$$g'(x_0) = f'_x(x_0, y_0) = 0$$

- Trenger tilsvarende andreordensbetingelser

$$g''(x) = f''_{xx}(x, y) < 0$$

- For minimum: $f''_{xx}(x, y) > 0$ og $f''_{yy}(x, y) > 0$
- Tilleggskrav, både for minimum og maksimum, f''_{xy} ikke kan bli for stor:

$$f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$$

- Maksimeringsproblemet:

$$\begin{aligned} \max_{x,y} f(x, y) \\ \text{s.t. } g(x, y) = 0 \end{aligned}$$

- Gir i Lagrangefunksjonen

$$\mathcal{L} = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

- Finn stasjonærpunktene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'_x &= 0 \\ \mathcal{L}'_y &= 0 \end{aligned}$$

- Eksempel: nytte-maksimering

$$\max_{x,y} u(x, y)$$

$$\text{s.t. } px + qy - m = 0$$

- gir Lagrangefunksjonen

$$\mathcal{L} = u(x, y) - \lambda (px + qy - m)$$

- stasjonærpunkter

$$\mathcal{L}'_x = u'_x - \lambda p = 0$$

$$\mathcal{L}'_y = u'_y - \lambda q = 0$$

- Kan løses videre til:

$$\frac{u'_x}{u'_y} = \frac{p}{q}$$

Uten bibetingelse

$$f^*(r) = \max_x f(x, r) = f(x^*(r), r)$$

$$f^{*'}(r) = f'_x(x^*(r), r)r'(x) + f'_r(x^*(r), r) = 0 + f'_r(x^*(r), r)$$

Fordi $f'_x(x^*(r), r) = 0$ som er førsteordensbetingelsen.

Med bibetingelse: $f'(r) = \mathcal{L}'_r$: Shepards lemma

$$c(x, w, q) = \min_{k, n} wn + qk = w\tilde{n}(x, w, q) + q\tilde{k}(x, w, q)$$

$$\text{gitt } f(n, k) = x$$

Lagrangefunksjon

$$\mathcal{L}(n, k; x, w, q) = wn + qk - \lambda (f(n, k) - x)$$

Da er

$$c'_w = \mathcal{L}'_w = \tilde{n}$$

$$c'_q = \mathcal{L}'_q = \tilde{k}$$

Logaritmer og eksponentialfunksjoner

- Vi husker her at

$$e^{\ln x} = x \text{ og tilsvarende } \ln(e^x) = x$$

- e og \ln er hendig ved at

$$\begin{aligned}\ln(ax^b) &= \ln a + b \ln x \\ e^{a+b \ln x} &= e^a x^b\end{aligned}$$

men husk at

$$\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$$

- Derivasjonsregelene

$$f(x) = \ln x \text{ gir } f'(x) = \frac{1}{x}$$

mens

$$g(x) = e^x \text{ gir } g'(x) = e^x$$

- Summen av de n første leddene en geometrisk rekke

$$S_n = a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} ak^i$$

- Enklere å huske utregning enn formel?
- Gang S_n med k og observer at det meste blir som før

$$kS_n = ak + ak^2 + ak^3 + \dots + ak^n$$

- Bare det første leddet i S_n og det siste i kS_n er spesielle. Når vi ta differansen ser vi da at

$$\begin{aligned} S_n - kS_n &= a - ak^n \\ (1 - k)S_n &= a(1 - k^n) \\ S_n &= a \frac{1 - k^n}{1 - k} \end{aligned}$$

- Om du sparer 10 000 per år i ti år med 5% rente vil det etter siste innbetaling stå ($a = 10000$, $n = 10$, og $k = 1,05$)



$$S_n = 10000 \sum_{i=0}^9 (1,05)^i = 10000 \frac{1 - 1.05^{10}}{1 - 1.05} = 125780$$

- Disponer tida
- Sørg for at du rekker de oppgavene du kan løse.
 - Ikke bruk opp tida på et delspørsmål hvor du står fast
- Svar på det du blir spurt om
- Husk at det er et regnekurs.
 - Figurer er flott
 - Men svar med regning når vi spør om det.
- *Lykke til!!*