



UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin – høsten 2011

Fredag 13. januar 2012

Oppgavesettet består av 6 sider

Viktige opplysninger:

Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

NB! Det leveres ikke ut spesielle reseptblanketter med oppgaven. Dersom du mener at noen av reseptene skal skrives på spesiell blankett, må du angi det i besvarelsen.

Du er lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567, kontoradresse Pæreveien 15, 2004 Lilleland. Telefon 67 07 88 99, kontortid mandag-torsdag 10-16.

Du oppsøkes av en av dine faste pasienter, Ola Nordmann, personnr. 030954 22456, Epleveien 16, 2004 Lilleland. Ola har en lang historie med depresjon og misbruk av alkohol og benzodiazepiner. Under et opphold på en A-klinikk fikk han forskrevet paroksetin 20 mg/dag mot depresjon på blå resept. Ola synes paroksetin hjelper bra, men han har problemer med søvnen. Etter at dere har diskutert problemene hans, blir dere enige om at han skal fortsette med samme dose paroksetin i et halvt år til. Mot søvnproblemene foreslår du at han skal prøve alimemazin (et førstegenerasjons antihistamin med uttalt sedativ og hypnotisk virkning), 10 mg ved sengetid ved behov.

- Skriv resept(er). Preparatopplysninger finnes nedenfor.
- Kunne du foretatt denne rekvisisjonen via telefaks? Begrunn svaret.
- Hva er trinnpris?

Preparatopplysninger hentet fra Norsk legemiddelhåndbok:

Paroksetin

Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner. Tvangslidelse (OCD). Panikklidelse med og uten agorafobi. Sosiale fobier. Generalisert angstlidelse (GAD).

Refusjonskode:			Refusjonskode:		
ICPC	Beskrivelse	Vilkår nr	ICD	Beskrivelse	Vilkår nr.
-73	Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse	-	-73	Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse	-
-74	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse	-	-74	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse	-
-F4	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse	-	-F4	Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse	-
P73	Affektiv lidelse	-	F31	Bipolar affektiv lidelse	-
P74	Panikk lidelse	-	F32	Depressiv episode	-
P76	Depressiv lidelse	-	F33	Tilbakevendende depressiv lidelse	-
P79	Angst agorafobi	-	F40.0	Agorafobi	-
P79	Angst sosial fobi	-	F40.1	Sosiale fobier	-
P79	Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)	-	F41.0	Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	-
			F42	Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)	-

Vilkår: Ingen

Paroxetin

«Actavis»

- tabletter 20 mg. 20 stk. (enpac) kr 109,80 (Trinnpris kr 54,90), 60 stk. (enpac) kr 211,90 (Trinnpris kr 142,60), 100 stk. (enpac) kr 333,70 (Trinnpris kr 237,70).

Paroxetin

«Aurobindo»

- tabletter 20 mg. 60 stk. (enpac) kr 271,30, 100 stk. (enpac) kr 429,90.

Paroxetin

«HEXAL»

- tabletter 20 mg. 20 stk. (enpac) kr 109,80 (Trinnpris kr 54,90), 60 stk. (enpac) kr 211,90 (Trinnpris kr 142,60), 100 stk. (enpac) kr 333,70 (Trinnpris kr 237,70).

Paroxetin

«Nycomed Pharma»

- tabletter 20 mg. 20 stk. (enpac) kr 188,70, 60 stk. (enpac) kr 506,20, 100 stk. (enpac) kr 820,80.

Seroxat

«Farmagon»

- tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 327,70 (Trinnpris kr 233,00), 100 stk. (enpac) kr 333,70 (Trinnpris kr 237,70).

Alimemazin

Rp. C Δ Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:

Pruritus ved forskjellige dermatologiske lidelser. Palliativ behandling i livets slutfase.

Refusjonskode:

Refusjonskode:

ICPC	Beskrivelse	Vilkår nr.	ICD	Beskrivelse	Vilkår nr.
-30	Annen langvarig og alvorlig hudsykdom	-	-30	Annen langvarig og alvorlig hudsykdom	-
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136	-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136
S86	Seboréisk dermatitt	-	L20	Atopisk dermatitt	-
S87	Atopisk dermatitt/eksem	-	L21	Seboréisk dermatitt	-
S88	Kontakt-/allergisk dermatitt IKA	-	L22	Bleiedermaitt	-
S89	Bleiedermaitt	-	L23	Allergisk kontaktdermatitt	-
S91	Psoriasis	-	L24	Toksisk kontaktdermatitt	-
S98	Urticaria	-	L40	Psoriasis	-
S99	Hud/underhud sykdom IKA	-	L50	Urticaria	-

Vilkår nr.

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Vallergan

«Aventis Pharma»

- mikstur 5 mg/ml. 150 ml kr 53,00.
- tabletter 10 mg. 25 stk. (enpac) kr 57,70.

FASIT.

a) Ola Nordmann kan få paroksetin mot depresjon på blå resept. Alimemazin kan forskrives på blå resept, men ikke når det benyttes som innsovningsmiddel. Det må derfor skrives to resepter. Ola skal ta en tablett paroksetin daglig, og en pakning på 100 tabletter vil da vare i litt over 3 måneder. Med en reiterasjon holder det til 6 måneders forbruk. Paroxetin "Aurobindo" og Paroxetin "Nycomed Pharma" er dyrere enn de andre. Man bør velge billigste synonym, evt kan man velge generisk forskrivning og overlate til apoteket å velge det billigste preparatet. Alimemazin er ikke forbundet med misbruksfare, så en kan velge å reitere resepten, siden det bare finnes små pakninger.

Reseptene kan se slik ut:

Resept 1 – skrives på særskilt blankett for blå resept.

Lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567
Pæreveien 15, 2004 Lilleland
Telefon 67 07 88 99.
Kontortid mandag-torsdag 10-16.

Ola Nordmann (M), 030954 22456
Epleveien 16, 2004 Lilleland

#

Rp PAROXETIN "Actavis" tabletter 20 mg no 100.
Dssn. Mot depresjon. En tablett tas hver kveld.
Reit 1 – en.
Generisk substitusjon: Ja.

Lilleland 13/1-2012 Anna Lovinda (egenhendig underskrift + stempel).
(På reseptblanketten påføres refusjonskode P76 etter ICPC eller F33 etter ICD).
Resept 2 skrives på vanlig, hvit blankett.

Lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567
Pæreveien 15, 2004 Lilleland
Telefon 67 07 88 99
Kontortid mandag-torsdag 10-16.

Ola Nordmann (M), 030954 22456
Epleveien 16, 2004 Lilleland

#

Rp. VALLERGAN tabletter 10 mg no 25
Dssn. Ved innsovningsvansker. En tablett tas kort før sengetid.
Reit 2 – to.
Lilleland 13/1-2012 Anna Lovinda (egenhendig undertegnet, stempel).

b) De begrensningene som gjelder for telefaksresepter er:

- 1) A-preparater ikke kan rekvireres.
- 2) For B-preparater kan bare minste pakning rekvireres.

3) Resepten kan ikke reitereres.

Dersom Ola skal ha en blå resept som skal gjelde for et halvt års forbruk, må den reitereres, da man bare kan forskrive legemiddel for 3 måneders forbruk om gangen. Dermed er det lite hensiktsmessig å benytte telefaksresept, men det er ikke noe i veien for å forskrive legemiddel for 3 måneders forbruk på blå resept og benytte telefaks. Resepten på Vallergan kan heller ikke reitereres hvis den sendes som telefaks-resept. c) Trinnpriis er den maksimale prisen Folketrygden dekker.

Det medisinske fakultet, Oslo, 10. januar 2012

Signatur leder av eksamenskommissjon